

Колоскові луски вузькі, нервація слабо виражена. Квіткові луски слабо виражена. Квіткові луски лінійно-ланцетні, тоненькі, гладенькі. Перехід квіткової луски в осток поступовий.

Зернівка ромбічна, велика, соломя'но-жовта. Маса 1000 насінин 48-50г.

Середньостиглий, вегетаційний період 79-87 днів. Солома середньої довжини, міцна.

Строки сівби ранні – перші дні початку польових робіт, норма висіву 4,50-5,0 млн.га схожих насінин.

На державних сортовипробувальних станціях отримали середній врожай за роки випробування – 45 ц/га, що на 5 відсотків більше стандартів. Потенційна можливість сорту 90 ц/га.

Сорт напівінтенсивного типу. Має хороші пивоварні властивості. Білка – 11, екстрактивність 78-80 відсотків. Стійкий до ураження борошністою рососою, бурою іржею.

Рекомендований для вирощування у зонах Лісостепу та Полісся.

**Асторія** – Заявник – фірма “Се кобра”, Франція. Виведений методом схрещування. Різновидність нутанс.

Колос двоградний, соломя'но-жовтий, остистий, конусоподібної форми, середньої щільності (на 4 см колосового стрижня припадає 12-14 членків), неламкий. Колоскові луски середньої довжини, вузькі.

Остюки довгі, у півтора рази перевищують довжину колоса, зазублені, при досяганні не опадають, ніжні, еластичні. Добре помітна перша пара квіткової луски. Перехід квіткової луски в остюк поступовий.

Зернівка жовта, півчаста, еліптична. Маса 1000 зерен 45-47г.

Середньостиглий, вегетаційний період коливається в межах 78 днів. Солома середньої довжини – 85 см, міцна, стійка проти вилягання. Посухостійкість середня. Стійкість проти вилягання висока.

Сорт інтенсивного типу, пластичний.

За даними заявника рекомендується висівати за 100-відсоткової господарської придатності 4 млн/га насінин.

Запізнення із сівбою на 5-10 днів призводить до значного недобору врожаю.

За роки випробування на державних сортовипробувальних станціях отримали середній врожай 43,4-45,9 ц/га.

Потенційна можливість сорту 95 ц/га.

Відновиться до сортів пивоварного призначення. Білка має 10,4-11,5%, півчастість 8-9, екстрактивних речовин 80 відсотків.

Слабко уражується гелмінтоспоріозом, більш стійкий проти борошністої роси, середньо пошкоджується шведською мухою.

Перед посівом обов'язкове протруювання насіння проти легкої сажки.

Рекомендований для вирощування у зонах Лісостепу та Полісся.