

Ефект – Виведений Інститутом рослинництва ім. Юр'єва методом Різновидність нутанс.

Форма куща прямостояча. Колос двохрядний, довгий, веретеноподібний, солом'яно-жовтий, нещільний (на 4 см колосового стрижня припадає 12 члеників).

Остюки довгі, майже паралельні, у півтора-два рази перевищують довжину колоса, зазублені, при досяганні не опадають, ніжні, еластичні.

Перехід квіткової луски в остюк поступовий. Колоскова луска мала, вузька, нервація відсутня. Зернівка жовта, плівчаста, видовжено-овальна. Маса 1000 зерен 48г.

Середньостиглий, вегетаційний період коливається в межах 83 дні. Солома середньої довжини – 79 см, міцна, стійка проти вилягання.

Сорт напівінтенсивного типу. За даними заявника рекомендується висівати за 100-відсоткової господарської придатності 4,5-5 млн/га насінин.

За роки випробування на державних сортовипробувальних станціях отримали середній врожай 42,6 ц/га. Потенційна можливість сорту 75-80 ц/га. Має відмінні круп'яні якості. Білка – 13,5%, вирівняність зерна 98%, вихід крупи – 44,5%. Середньо пошкоджується шведською мухою.

Перед посівом обов'язкове протруювання насіння проти летючої сажки.

Рекомендований для вирощування у зоні Полісся.

Султан – Заявник – фірма Се кобра (Франція).

Виведений методом схрещування.

Різновидність нутанс.

Форма куща прямостояча. Колос дворядний, середньої щільності, солом'яно-жовтий (на 4 см колосового стрижня 10-12 члеників), довжина 8-9 см, слабо поникає не ламається.

Листки темно-зелені, середньої ширини.

Колоскова луска тоненька. Остюки солом'яно-жовті, довгі, слабо розходяться, сильно зазублені.

Квіткова луска ніжна, зморшкувата, нервація добре виражена. Перехід квіткової луски в остюк поступовий.

Щетинка біля основи зернівки довго волосиста.

Зернівка еліптична, жовта, велика. Маса 1000 насінин – 45г.

Середньостиглий, дозріває на 4 дні раніше стандартів. Солома міцна, стійка до вилягання та осипання.

За даними заявника, рекомендується висівати за 100-відсоткової господарської придатності 4,0-4,5 млн/га схожих насінин. Запізнення із сівбою призводить до значних втрат врожаю.

Сорт інтенсивного типу, пластичний. Добре реагує на повне внесення мінерального живлення.

Пивоварні якості відмінні. Білка має 10,7-11,4%, екстрактивність – 80 відсотків.

Високоврожайний. На державних сортовипробувальних станціях отримали середній врожай 41,2-46,4 ц/га. Потенційна можливість сорту – 100 ц/га.

Стойкий до ураження борошнистою росюю, гельмінтоспориозом.

Рекомендований для вирощування у зонах Степу, Лісостепу та Полісся.

Скіф – заявник Вінницька о.д.с.г.д. станція.

Різновидність нутанс.

Форма куща прямостояча. Стебло середньої висоти – 86 см. Листок зелений з фіолетовим відтінком, опушення відсутнє, ланцетовидної форми.

Колос дворядний, солом'яно-жовтий, підвищеної щільності, довжиною – 8-9 см.

Остюки довгі – 12-13 см, зазублені, притиснуті до колосу, під час досягання часто опадають.

Колоскові луски гладенькі. Квіткові луски не мають забарвлення, з маленькими зубчиками. Перехід квіткової луски в остюк поступовий. Основна щетинка повстяна.

Сорт середньостиглий. Вегетаційний період 95 днів. За даними заявника, рекомендується висівати за 100-відсоткової господарської придатності 4,5-5 млн/га насінин.

Пивоварного напрямку. Білка має 10,5, екстрактивність – 80, крохмалю – 62 відсотки.

Посухостійкість середня. Сорт середньостійкий проти летючої і твердої сажки.

На державних сортодослідних станціях отримали середній врожай за роки випробування 42,3 ц/га, що на 4,8 ц/га більше стандартів. Потенційна можливість сорту 85 ц/га.

Адажіо – заявник „Секобра”, Франція.

Різновидність нутанс.

Колос дворядний, середньої довжини – 8-10 см, середньої щільності (на 4 см колосового стрижня припадає 12-14 члеників), слабо звужується до верхівки, солом'яно-жовтий.

Остюки довгі, зазублені, паралельні, тонкі, еластичні, жовті. Колоскова луска слабо зморшкувата, нервація добре виявлена, перехід в остюк поступовий. Основна щетинка зерна довговолосиста.

Кущ прямостоячий, листки не опушені, проміжні, зелені. Висота рослин – 85 см.

Зернівка жовта, велика, продовженої форми. Маса 1000 насінин – 50г.

Середньостиглий, досягає за 83 дні. Сорт інтенсивного типу.

За даними заявника рекомендується висівати за 100-відсоткової господарської придатності 4,0-4,5 млн/га насінин. Запізнення із сівбою приводить до значних втрат врожаю.

Агротехніка звичайна для зони вирощування.