

Високорожайний. На державних сортовипробувальних станціях отримали середній врожай 41,2-46,4 ц/га. Потенційна можливість сорту – 100 ц/га.

Стойкий до ураження борошнистою росю, гелмінтоспоріозом.

Рекомендований для вирощування у зонах Степу, Лісостепу та Полісся.

Скіф – заявник Вінницька о.д.с.г.д. станція.

Різновидність нутанс.

Форма куща прямостояча. Стебло середньої висоти – 86 см. Листок зелений з фіолетовим відтінком, опушення відсутнє, ланцетовидної форми.

Колос дворядний, солом'яно-жовтий, підвищеної щільності, довжиною – 8-9 см.

Остюки довгі – 12-13 см, зазублені, притиснуті до колосу, під час достигання часто опадають.

Колоскові луски гладенькі. Квіткові луски не мають забарвлення, з маленькими зубчиками. Перехід квіткової луски в остюк поступовий. Основна щетинка повстяна.

Сорт середньостиглий. Вегетаційний період 95 днів. За даними заявника, рекомендується висівати за 100-відсоткової господарської придатності 4,5-5 млн/га насінин.

Пивоварного напрямку. Білка має 10,5, екстрактивність – 80, крохмалю – 62 відсотки.

Посухостійкість середня. Сорт середньостійкий проти летючої і твердої сажки.

На державних сортодослідних станціях отримали середній врожай за роки випробування 42,3 ц/га, що на 4,8 ц/га більше стандартів. Потенційна можливість сорту 85 ц/га.

Адажіо – заявник „Секобра”, Франція.

Різновидність нутанс.

Колос дворядний, середньої довжини – 8-10 см, середньої щільності (на 4 см колосового стрижня припадає 12-14 члеників), слабо звужується до верхівки, солом'яно-жовтий.

Остюки довгі, зазублені, паралельні, тонкі, еластичні, жовті. Колоскова луска слабо зморшкувата, нервація добре виявлена, перехід в остюк поступовий. Основна щетинка зерна довговолосиста.

Кущ прямостоячий, листки не опушені, проміжні, зелені. Висота рослин – 85 см.

Зернівка жовта, велика, продовженої форми. Маса 1000 насінин – 50г.

Середньостиглий, достигає за 83 дні. Сорт інтенсивного типу.

За даними заявника рекомендується висівати за 100-відсоткової господарської придатності 4,0-4,5 млн/га насінин. Запізнення із сівбою приводить до значних втрат врожаю.

Агротехніка звичайна для зони вирощування.