

Високоврожайний. На державних сортовипробувальних станціях отримали середній врожай 41,2-46,4 ц/га. Потенційна можливість сорту – 100 ц/га.

Стійкий до ураження борошнистою росюю, гельмінтоспориозом.

Рекомендований для вирощування у зонах Степу, Лісостепу та Полісся.

**Скіф** – заявник Вінницька о.д.с.г.д. станція.

Різновидність нутанс.

Форма куща прямостояча. Стебло середньої висоти – 86 см. Листок зелений з фіолетовим відтінком, опушення відсутнє, ланцетовидної форми.

Колос дворядний, солом'яно-жовтий, підвищеної щільності, довжиною – 8-9 см.

Остюки довгі – 12-13 см, зазублені, притиснуті до колосу, під час досягання часто опадають.

Колоскові луски гладенькі. Квіткові луски не мають забарвлення, з маленькими зубчиками. Перехід квіткової луски в остюк поступовий. Основна щетинка повстяна.

Сорт середньостиглий. Вегетаційний період 95 днів. За даними заявника, рекомендується висівати за 100-відсоткової господарської придатності 4,5-5 млн/га насінин.

Пивоварного напрямку. Білка має 10,5, екстрактивність – 80, крохмалю – 62 відсотки.

Посухостійкість середня. Сорт середньостійкий проти летючої і твердої сажки.

На державних сортодослідних станціях отримали середній врожай за роки випробування 42,3 ц/га, що на 4,8 ц/га більше стандартів. Потенційна можливість сорту 85 ц/га.

**Адажіо** – заявник „Секобра”, Франція.

Різновидність нутанс.

Колос дворядний, середньої довжини – 8-10 см, середньої щільності (на 4 см колосового стрижня припадає 12-14 члеників), слабо звужується до верхівки, солом'яно-жовтий.

Остюки довгі, зазублені, паралельні, тонкі, еластичні, жовті. Колоскова луска слабо зморшкувата, нервація добре виявлена, перехід в остюк поступовий. Основна щетинка зерна довговолосиста.

Кущ прямостоячий, листки не опушені, проміжні, зелені. Висота рослин – 85 см.

Зернівка жовта, велика, продовженої форми. Маса 1000 насінин – 50г.

Середньостиглий, досягає за 83 дні. Сорт інтенсивного типу.

За даними заявника рекомендується висівати за 100-відсоткової господарської придатності 4,0-4,5 млн/га насінин. Запізнення із сівбою приводить до значних втрат врожаю.

Агротехніка звичайна для зони вирощування.

Має високі пивоварні властивості. Білка має 10,5%, плівчастість – 8-9, екстрактивних речовин 80-82, крохмалю – 58-62 відсотки.

Має комплексну стійкість до більшості поширених хвороб: летючої сажки, твердої і чорної сажки, борошнистої роси, гельмінтоспоріозу.

На державних сортодослідних станція отримали середній врожай 47,0 ц/га, що на 7,6 відсотків більше стандартів. Потенційна можливість сорту 90 ц/га.

Рекомендований для вирощування по зонах Лісостепу та Полісся.

### **Докучаєвський 15** – заявник ХДАУ ім. В.В. Докучаєва.

Різновидність – нутанс. Форма куща прямостояча. Стебло середньої висоти – 72 см. Листки темно-зелені, середньої ширини.

Колос двохрядний, солом'яно-жовтий, нещільний (на 4 см колосового стрижня припадає 10-11 члеників), під час досягання поникає середньо, неламкий. Часто із піхви листка повністю не виходить.

Остюки довгі, зазубрені, ніжні, еластичні, світло-жовті.

Зернівка еліптична, світло-жовта, велика. Маса 1000 насінин – 46г.

Квіткова луска тонка, дрібно зморшкувата. Перехід її в остюк поступовий.

Вегетаційний період 80 днів. Середньо стійкий проти вилягання, а в дуже вологі роки дещо полягає. Посухостійкість середня.

За даними заявника рекомендується висівати за 100-відсоткової господарської придатності 4,5-5 млн/га насінин.

Пивоварний. Вміст білка 11%, екстрактивність – 78, крохмалю – 62 %.

Летючою сажкою, борошнистою росою і гельмінтоспоріозом уражується середньо.

На державних сортодослідних станціях отримали середній врожай 42,7 ц/га, що на 5,7 відсотки більше стандартів. Потенційна можливість сорту 87 ц/га.

Рекомендований для вирощування по зонах Лісостепу та Полісся.

Данута – заявник “Заатен Уніон”, Німеччина.

Різновидність нутанс.

Форма куща прямостояча. Колос двурядний, злегка звужується до верхівки, середньої щільності (на 4 см колосового стрижня 12-14 члеників), довжина 11-13 см, слабо поникає. Остюки довгі, паралельні, зазублені, зубчики розміщені по обох краях від основи до верху.

Квіткові луски лінійно-ланцетні, тоненькі.

Перехід квіткової луски в остюк поступовий, основна щетинка довговолосиста.

Зернівка видовжено-овальної форми, жовтого кольору, маса 1000 насінин – 50г.

Середньостиглий, вегетаційний період 78 днів. Солома міцна, стійка проти вилягання.

За даними заявника, рекомендується висівати за 100-відсоткової господарської придатності 3,5-4,0 млн/га насінин.

Сорт інтенсивного типу, стійкий до осипання. Добрі результати дає при внесенні повного мінерального живлення.

Особливістю сорту є те, що він відрізняється підвищеною кустистістю та раннім строком сіву.