

Відноситься до сортів пивоварного призначення. Білка має 10,5, плівчастість 7-8, екстрактивних речовин – 80-82 відсотки. Борошнистою росюю, бурою іржею уражується нижче стандартів.

На державних сортодослідних станціях отримали середній врожай за роки випробування 47,1 ц/га, що на 7,4 відсотків більше стандартів. Потенційна можливість сорту 100 ц/га.

Рекомендований для вирощування по зонах Степу, Лісостепу та Полісся.

Вакула – заявник СГП.

Різнovidність – паллідум.

Куш прямостоячий, листки не опушені, проміжні, зелені. Колос шестирядний, середньої довжини (7-9 см), середньої щільності (на 4 см колосового стрижня 10-11 члеників), неламкий, слабо пониклий, прямокутної форми з переходом у ромбічну, соломяно-жовтий.

Остюки довгі – 14-18 см, злегка розлогі, тонкі, еластичні, слабо зазубрені, у верхній частині жовті, при обмолоті легко відділяються.

Колоскова луска тоненька, ніжна, з рідкими волосками. Квіткова луска середньо зморшчувата, нервация добре виявлена, без зубчиків, перехід в остюк поступовий. Основна щетинка зерна коротка, довго волосяна.

Висота рослин 65-75 см.

Зернівка видовжено-овальна, розмір 13x14 мм, жовта, вирівняна.

Маса 1000 насінин 44г.

Середньостиглий, дозріває за 80 днів.

Високий врожай завжди гарантований, якщо з весни склалися умови для нормального розвитку вузлової кореневої системи і в ґрунті є достатньо поживних речовин.

Сорт придатний для вирощування в умовах посухи і підвищеної кислотності ґрунтів.

За даними заявника рекомендується висівати за 100-відсоткової господарської придатності 4,5-5 млн/га насінин.

Сорт має групу стійкості до сажкових хвороб, борошнистої роси, гельмінтоспориозу.

На державних сортодослідних станціях отримали середній врожай 48,4 ц/га, що на 8,8 відсотки більше стандартів. Потенційна можливість сорту 105 ц/га.

Рекомендований для вирощування по зонах Степу, Лісостепу та Полісся.

Пасадена – заявник фірма “Земундо”, Нідерланди.

Різнovidність нутанс. Форма куща прямостояча. Колос дворядний, злегка звужується до верхівки, середньої щільності (на 4 см колосового стрижня 12-14 члеників), довжина 8-9 см, слабо поникає. Листки світло-зелені, без опушення, ланцетовидної форми.

Остюки довгі, ніжні, перевищують довжину колоса у півтора-два рази. Квіткові луски не мають забарвлення. Перехід квіткової луски в остюк поступовий. Щетинка біля основи зерна довговолосиста.