

Посухостійкість середня. Сорт середньостійкий проти летючої і твердої сажки.
Рекомендований для вирощування в зоні Лісостепу.

Соборний – заявник Миронівський інститут пшениці ім. В.М.Ремесла.

Різновидність нутанс.

Форма куща прямостояча. Колос дворядний, слабо звужується до верхівки, довжиною 6-9 см, солом'яно-жовтий, середньої щільності (на 4 см колосового стрижня 11-13 члеників), слабо поникає.

Остистий, остюки зазублені, пружні, перевищують довжину колоса у 1,5 рази.

Стебло середньої висоти – 88 см, світло-жовте. Листки зелені, широкі. Колоскова луска – мала, вузька, нервація відсутня.

Квіткова луска ніжна, зморшкувата. Переход квіткової луски в остюк поступовий. Щетинка біля основи зернівки довговолосиста.

Зернівка велика, еліптичної форми. Маса 1000 насінин 48г.

Середньостиглий, вегетаційний період 87-93 дні. Стійкий до вилягання. Посухостійкість висока.

Сорт інтенсивного типу. За даними заявителя рекомендуються висівати за 100-відсоткової господарської придатності 4,5-5,0 млн/га насінин. Строк сівби ранній – перші дні початку польових робіт.

На державних сортовипробувальних станціях отримали середній врожай 44,9 ц/га, що на 6,6 відсотка більше стандартів.

Сорт пивоварного призначення. Вміст білка 10,2%, екстрактивних речовин – 82, плівчастість 8-9 та крохмалю 62 відсотки.

Стійкий до ураження борошнистою росою, жовтою іржею, смугастим гельмінтоспоріозом.

Рекомендований для вирощування в зонах Степу та Полісся.

Персей – заявник Миронівський інститут пшениці ім. В.М.Ремесла.

Різновидність нутанс.

Форма куща прямостояча.

Стебло середньої висоти – 81 см, листки темно-зелені, середньої ширини.

Колос дворядний, остистий, ледь звужений до верхівки, довжиною 7-11 см.

Остюки довгі, зазубрені. У період молочно-воскової стигlosti остюки мають слабкий фіолетовий відтінок.

Квіткова луска ніжна, зморшкувата, нервація добре виражена. Щетинка зернівки довго волосиста. Зернівка велика, еліптичної форми. Маса 1000 зерен – 45г. Середньостиглий, вегетаційний період 87 днів.

Як сорт інтенсивного типу вимагає високої сортової агротехніки. За даними заявителя, рекомендуються висівати за 100-відсоткової господарської придатності 4,5-5,0 млн/га насінин.

На державних сортовипробувальних станціях отримали середній врожай 44,5 ц/га, що на 5,9 відсотка більше стандартів.

Сорт кормового і пивоварного призначення.

Білка має 11-12,5%, вихід крупи 44,5, вирівняність зерна – 96 відсотків.

Потенційна можливість сорту 95 відсотків.

Стійкий до ураження сітчастим гельмінтоспоріозом, борошнистою росою.

Рекомендований для вирощування в зоні Полісся.

Варіант – заявник Чернігівська державна с.г. дослідна станція, Носівська с.д. станція.
Різновидність - нутанс.

Форма куща прямостояча. Стебло середньої висоти – 85 см. Листки темно-зелені, середньої ширини. Колос дворядний, солом'яно-жовтий, нещільний (на 4 см колосового стрижня 10-11 члеників), довжиною 7-8 см, слабо поникає. Остюки довгі (довші колоса в 1,5 раза), вверху слабо зазублені, зубчики розміщені по обох краях від основи до низу. Квіткові луски зморшкуваті, лінійно-ланцетні, тоненькі.

Перехід квіткової луски в остюк поступовий, основна щетинка довго волосиста.

Зернівка еліптична, нижня частина трохи вкорочена і розширені, жовтого кольору. Маса 1000 зерен 45г. Середньостиглий, вегетаційний період – 85 днів.

За даними заявитика, рекомендуються висівати при 100-відсоткової господарської придатності 4,5-5 млн/га насінин. На державних сортовипробувальних станціях отримали середній врожай 41,6 ц/га, що на 7,8 відсотка більше стандартів. Сорт напівінтенсивного типу, стійкий до осипання.

Відноситься до сортів пивоварного призначення. Білка має 10,7-11,8 відсотків, плівчастість 8-10, екстрактивних речовин 79, крохмалю 58-60 відсотків.

Стійкий до ураження борошнистою росою, гельмінтоспоріозом уражується середньо. Рекомендований для вирощування в зоні Полісся.

Докучаєвський 18 – заявник Харківський державний аграрний університет ім.. В.В.Докучаєва.
Різновидність нутанс.

Форма куща прямостояча. Стебло середньої висоти – 72 см. Листки темно-зелені, середньої ширини. Колос дворядний, солом'яно-жовтий, нещільний (на 4 см колосового стрижня припадає 10-11 члеників), під час досягання поникає середньо, неламкий. Часто із піхви листка повністю не виходить.

Остюки довгі, зазубрені, ніжні, еластичні, світло-жовті. Зернівка еліптична, світло-жовта, велика. Маса 1000 насінин 46г.

Квіткова луска тонка, дрібно зморшкувата. Перехід її в остюк поступовий. Вегетаційний період 80 днів. Середньо стійкий проти вилягання, а в дуже вологі роки дещо полягає. Посухостійкість середня.

За даними заявитика, рекомендуються висівати за 100-відсоткової господарської придатності 4,5-5 млн/га насінин. На державних сортовипробувальних станціях отримали середній врожай 41,2 ц/га, що на 6,8 відсотка більше стандартів.