

Потенційна можливість сорту 95 відсотків.  
 Стейкий до ураження сітчастим гельмінтоспориозом, борошнистою росою.  
 Рекомендований для вирощування в зоні Полісся.

**Варіант** – заявник Чернігівська державна с.г. дослідна станція, Носівська с.д. станція.  
 Різновидність - нутанс.

Форма куща прямостояча. Стебло середньої висоти – 85 см. Листки темно-зелені, середньої ширини. Колос дворядний, солом'яно-жовтий, нещільний (на 4 см колосового стрижня 10-11 члеників), довжиною 7-8 см, слабо поникає.

Остоки довгі (довші колоса в 1,5 раза), вверху слабо зазублені, зубчики розміщені по обох краях від основи до низу. Квіткові луски зморшкуваті, лінійно-ланцетні, тоненькі.

Перехід квіткової луски в осток поступовий, основна шетинка довго волосиста.  
 Зернівка еліптична, нижня частина трохи вкорочена і розширена, жовтого кольору. Маса 1000 зерен 45г.

Середньостиглий, вегетаційний період – 85 днів.

За даними заявника, рекомендується висівати при 100-відсотковій господарської придатності 4,5-5 млн/га насінин.  
 На державних сортопробувальних станціях отримали середній врожай 41,6 ц/га, що на 7,8 відсотка більше стандартів.  
 Сорт напівінтенсивного типу, стійкий до осипання.

Відноситься до сортів пивоварного призначення. Білка має 10,7-11,8 відсотків, плівчастість 8-10, екстрактивних речовин 79, крохмалю 58-60 відсотків.

Стейкий до ураження борошнистою росою, гельмінтоспориозом уражується середньо.  
 Рекомендований для вирощування в зоні Полісся.

**Докучаєвський 18** – заявник Харківський державний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва.  
 Різновидність нутанс.

Форма куща прямостояча. Стебло середньої висоти – 72 см. Листки темно-зелені, середньої ширини.  
 Колос дворядний, солом'яно-жовтий, нещільний (на 4 см колосового стрижня припадає 10-11 члеників), під час достигання поникає

середньо, неламкий. Часто із піхви листка повністю не виходить.

Остоки довгі, зазубрені, ніжні, еластичні, світло-жовті.

Зернівка еліптична, світло-жовта, велика. Маса 1000 насінин 46г.

Квіткова луска тонка, дрібно зморшкувата. Перехід її в осток поступовий.  
 Вегетаційний період 80 днів. Середньо стійкий проти вилягання, а в дуже вологі роки дещо полягає. Посухостійкість середня.

За даними заявника, рекомендується висівати за 100-відсотковою господарської придатності 4,5-5 млн/га насінин.  
 На державних сортопробувальних станціях отримали середній врожай 41,2 ц/га, що на 6,8 відсотка більше стандартів.