

Пивоварний. Вміст білка – 11, екстрактивність – 78, крохмалю – 62 відсотки.
Летючою сажкою, борошнистою росою і гельмінтоспориозом уражується середньо.
Рекомендований для вирощування в зоні Полісся.

Княжий – заявник Інститут землеробства і тваринництва західного регіону України.

Різновидність нутанс.

Форма куща прямостояча. Колос дворядний, середньої довжини – 8-9 см, слабо звужується до верхівки, середньої щільності. Остюки довгі, ніжні, перевищують довжину колоса у півтора рази.

Зерно середнього розміру, еліптичної форми, маса 1000 насінин – 43г.

Рослини середньої висоти, досить стійкі до вилягання. Перехід квіткової луски в остюк поступовий, основна щетинка довговолосиста.

Середньостиглий, досягає за 80 днів.

За даними заявника, рекомендується висівати за 100-відсоткової господарської придатності 4,0-4,5 млн/га насінин.

На державних сортовипробувальних станціях отримали середній врожай 44,6 ц/га, що на 15,7 відсотка більше стандартів.

Належить до сортів інтенсивного типу. Пивоварні якості добрі. Вміст білка – 11, екстрактивність – 80, крохмалю – 61 відсоток.

Стійкий до ураження борошнистою росою, гельмінтоспориозом.

Рекомендований для вирощування в зоні Полісся.

Кадікс – заявник “Секобра” Франція.

Різновидність нутанс.

Колос дворядний, середньої довжини – 8-10 см, середньої щільності (4 см колоскового стрижня – 12-14 члеників), слабо звужується до верхівки, солом'яно-жовтий.

Остюки довгі, зазубрені, паралельні, тонкі, еластичні, жовті. Колоскова луска слабо зморшкувата, нервація добре виявлена, перехід в остюк поступовий. Основна щетинка зерна довговолосиста.

Кущ прямостоячий, листки не опушені, проміжні, зелені. Висота рослин – 85 см.

Зернівка жовта, велика, подовженої форми. Маса 1000 насінин – 50г. Середньостиглий, дозріває за 83 дні. Сорт інтенсивного типу. За даними заявника рекомендується висівати за 100-відсоткової господарської придатності 4,0-4,5 млн/га насінин.

На державних сортовипробувальних станціях отримали середній врожай 42,3 ц/га, що на 9,6 відсотка більше стандартів.

Дуже реагує на запізнення із сівбою.

Агротехніка звичайна для зони вирощування.

Має високі пивоварні властивості. Білка має 10,5, плівчастість – 8-9, екстрактивність – 80-82, крохмалю 58-62 відсотки.

Має комплексну стійкість до більшості поширених хвороб: летючої сажки, твердої і чорної сажки, борошнистої роси, гельмінтоспоріозу.

Рекомендований для вирощування в зоні Полісся.

Європрестиж – заявник „Монсанто Україна”.

Різновидність нутанс. Форма куща прямостояча. Колос дворядний, циліндричний, злегка звужується до верхівки, солом'яно-жовтий, середньої щільності (на 4 см колосового стрижня припадає 12-14 члеників), неламкий.

Стебло середньої висоти - , світло-жовте, міцне. Листки зелені, опушення слабо виражене, ланцетної форми.

Остюки довгі, зазублені, солом'яно-жовті, трохи розходяться.

Квіткові луски лінійно-ланцетні, тоненькі, зморшкуваті. Добре помітна перша пара квіткової луски. Перехід квіткової луски в остюк поступовий.

Колоскові луски вузькі, рівні відносно зернівки, нервація слабо виражена.

Зернівка ромбічна, велика, маса 1000 насінин - г, солом'яно-жовтого кольору.

Середньостиглий, вегетаційний період коливається в межах - днів. Сорт інтенсивного типу, пластичний, стійкий проти осипання та полягання.

Строки сівби ранні, норма висіву 4,0-4,5 млн.га схожих насінин.

На державних сортодослідних станціях отримали середній врожай 42,2 ц/га, що на 9,4 відсотка більше стандартів. Потенційна можливість сорту 110 ц/га.

Має добрі пивоварні властивості. білка – 11,5, екстрактивність – 82 відсотки. Стійки до ураження борошнистою россою, бурою іржею.

Рекомендований для вирощування у зонах Лісостепу та Полісся.

Лінус – заявник фірма „Данія Хандел”, Данія.

Різновидність нутанс. Форма куща прямостояча. Колос дворядний, злегка звужується до верхівки, середньої щільності (на 4 см колосового стрижня припадає 12-14 члеників), довжина 11-13 см, слабо поникає. Остюки довгі, паралельні, зазублені, зубчики розміщені по обох краях від основи до верху.

Квіткові луски лінійно-ланцетні, тоненькі. Перехід квіткової луски в остюк поступовий, основна щетинка довговолосиста.

Зернівка видовжено-овальної форми, солом'яно-жовтого кольору. Маса 1000 насінин 45-50 г.

Середньостиглий, вегетаційний період - днів.

Солома міцна, стійка до вилягання.

Строки сівби ранні – перші дні початку польових робіт, норма висіву 4-4,5 млн/га схожих насінин.

На державних сортодослідних станціях отримали середній врожай 43,2 ц/га, що на 4,6 відсотка більше стандартів.

Сорт інтенсивного типу.