

Кількість бобів на рослині – 10-12. Насінин у бобі 5-6, максимальна кількість – 9. Насінина жовта, округла, гладенька. Маса 1000 насінин – 230-245г.

Середньостиглий. Вегетаційний період 79-84 дні. Стійкий до посухи та осипання.

За даними заявника норма висіву 1,2 млн/га схожих насінин. Білка має 24,1%. Аскохітозом уражується середньо, гороховою плодожеркою і попелицею пошкоджується нижче середнього. Потенційна можливість сорту до 55 ц/га.

Рекомендований для вирощування у зонах Лісостепу та Полісся.

Дамир 1 - Заявник – Науково-дослідна комерційно-виробнича фірма Мир-Сем.

Різновидність екадукум. Сходи зелені. Стебло звичайне, заввишки 50-70см. Загальна кількість міжвузлів 13-14, до першого суцвіття 8-10. Листки з трьома парами яйцеподібних цільнокраїх листочків.

Квіткі білі, по дві на квітконіжці. Боби прямі, з загостреним кінцем, завдовжки 5-5,5 см. Кількість насінин у бобі 5-6, максимальна – 9. Насінина жовта, округла, гладенька, на місці рубчика – сім'яніжка. Маса 1000 насінин – 210-240г.

Середньостиглий. Вегетаційний період 73-90 днів. Посухостійкий, досить стійкий до осипання та полягання. Придатний до механізованого збирання.

За даними заявника норма висіву – 1,1 млн/га схожих насінин.

Вміст білка в насініні залежно від умов вирощування становив 24,7-25,6%. Високоврожайний. На Ново одеській державній сортовипробувальній станції отримали врожай 40-50 ц/га.

Середньо уражується аскохітозом.

Рекомендований для вирощування у зоні Степу.

Харківський 320 - Виведений у Інституті рослинництва ім. В.Я.Юр'єва УААН методом гібридизації.

Різновидність - екадукум.

Стебло просте, зелене, висотою 80-89 см. Загальне число міжвузлів – 16-19, до першого суцвіття 13-14. Листки складаються із двох-трьох пар овально-яйцеподібних листочків. Квіткі білі, великі, по дві на квітконіжці. Боби світло-жовті, прямі з тупою верхівкою, завдовжки 5-5,5см. Кількість бобів на рослині – 10-12. Насінин у бобі 5-6, максимальна кількість – 9. Насіння жовто-рожеве, округле, гладеньке, іноді злегка зморшкувате. Маса 1000 насінин – 262г.

Середньостиглий. Вегетаційний період 83-87 днів. Посухостійкий, стійкий до осипання.

За даними заявника норма висіву 1,2 млн/га схожих насінин. Білка має 23,8-25,2%. Аскохітозом уражується середньо, гороховою плодожеркою і попелицею пошкоджується нижче середнього. Смакові якості добрі, коефіцієнт розварювання 4,4-4,5.

Урожайний. На державних сортовипробувальних станціях та дільницях за роки випробування отримали урожай 25-25,5 ц/га. Потенційна можливість сорту 60 ц/га.

Рекомендований для вирощування у зонах Степу і Лісостепу.