

Волоть компактна, щільна, поникла, довжиною 15-16 см, має 105-120 колосків розміром 7,1x3,4x2,1 мм. Викривлення основної осі волоті слабке. Час викидання волоті (50% рослин з волоттю) середнє. Антоціанове забарвлення кіля нижньої квіткової луски середнє. Антоціанове забарвлення зони під верхівкою нижньої квіткової луски та верхівки середнє.

Забарвлення приймочки колоска світло пурпурове. Товщина стебла середня. Антоціанове забарвлення вузлів стебла сильне. Опушення нижньої квіткової луски колоска відсутнє або дуже слабке. Колоски на нижній квітковій лусці колоска короткі. Забарвлення верхівки нижньої квіткової луски колоска пурпурове. Остюки волоті вітсутні або дуже короткі. Час визрівання сорту 118-125 днів. Зерно коротке. Зернівка – кругла. Ширина зерна середня. Обрушене зерно напівкругле (вид збоку). Біле. Розмір серцевини полірованого зерна відсутнія або дуже мала.

Сорт високопродуктивний, за роки випробування урожай сорту Зубець складав 72,0-90,7 ц/га, що дає можливість одержувати по 54,3 ц/га крупи, 5 ц/га – січки, 8,5 ц/га мучки та 10-12,5 ц/га лушпиння. Плівчастість 18%. Маса 1000 зерен 31 г. Скловидність 90%, вихід цілого ядра 92%, вихід крупи при обрушенні зерна 68%, тріщинуватість 8-10%. Колір крупи білий, колір каші білий.

Вегетаційний період сорту 120 днів. Висота рослин 90-95 см.

Продуктивна кущистість 2,4. Число зерен волоті 155 шт. Пустозерність 14 %. Сорт стійкий до осипання та вилягання, добре реагує на рівень азотних добрив. Оптимальний строк посіву перша декада травня. Норма висіву 5,5-6,0 млн. всхожих насінин на 1 гектар. Сорт не реагує на обробіток посівів гербіцидами. Сорт придатний до механізованого збирання та переробки урожаю, рекомендується для вирощування в степовій зоні України.

Рекомендований до Реєстру сортів рослин України по зоні Степу.

Славутич. Сорт рису з подовженою зернівкою виведений дослідною станцією рису УААН методом індивідуального добору, підвід японіка, різновидність італіка. Сорт призначений для виробництва крупи.

Ознаки сорту. Кущ компактний, прямостоячий, стійкий до вилягання, висота рослин 85-90 см. Листки середньої довжини, широкі, зелені. Антоціанове забарвлення листка відсутнє. Опушення пластинки передостаннього листка відсутнє. Зігнутість пластинки прапорцевого листка відсутня або дуже слабка.

Волоть компактна, щільна, довжиною 14-16 см, має 115-136 колосків, розміром 8,6x3,0x2,1 мм. Час викидання волоті середнє. Антоціанове забарвлення кіля нижньої квіткової луски відсутнє або дуже слабке. Антоціанове забарвлення зони під верхівкою нижньої квіткової луски відсутнє або дуже слабке. Антоціанове забарвлення верхівки нижньої квіткової луски відсутнє або дуже слабке. Забарвлення приймочки колоска біле. Товщина та довжина стебла середні. Антоціанове забарвлення вузлів стебла відсутнє або дуже слабке. Довжина

волоті середня. Викривлення основної осі волоті відсутнє або дуже слабке. Опушення нижньої квіткової луски відсутнє або дуже слабке. Волоски на нижній квітковій лусці колоска довгі, забарвлення верхівки нижньої квіткової луски колоска біле.

Остюки волоті відсутні або дуже короткі. Маса 1000 повністю сформованих зерен велика і складає 33 г. Зерно довге, середньої ширини, форма (вид збоку) обрушеного зерна напівверетеноподібна, білого кольору. Розмір білої серцевини полірованого зерна малий. Ендосперм неглютинозний.

Сорт Славутич дозріває на 5-7 діб раніше, висота рослин менша в порівнянні з сортом Україна-5 і складає 91 см. За роки випробування урожай складав 50,8-75,3 ц/га. Плівчатість 19%. Скловидність 93%. Вихід цілого ядра 87%. Вихід крупи при обрушенні зерна 67%. Колір крупи і колір каші білий. Вегетаційний період 118 днів. Пустозерність 16%. Оптимальні строки посіву – 11 декада травня, норма висіву 5,5-6,0 млн. всхожих насінин на 1 га.

Сорт не реагує на обробіток гербіцидами, придатний для механізованого збирання та переробки врожаю, рекомендується для вирощування в степовій зоні України.

Рекомендований до Реєстру сортів рослин України по зоні Степу.