

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 05041027

Вид: Цибуля городня
Allium sera L.

Назва сорту: Кампіло F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету: 31.10.2005

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2006

Свідоцтво про державну реєстрацію №

| № | Ознака | Проявлення | Код |
|----|---|--------------------------|-----|
| 1 | Рослина: кількість листків на псевдостеблі | помірна | 5 |
| 2 | Листя: положення | пряме | 1 |
| 3 | Листя: восковий наліт | дуже сильний | 9 |
| 4 | Листя: інтенсивність зеленого кольору | сильна | 7 |
| 5 | Листя: зігнутість | слабка | 3 |
| 6 | Листок: за довжиною | довгий | 7 |
| 7 | Листок: за діаметром | середній | 5 |
| 8 | Несправжнє стебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка) | коротке | 3 |
| 9 | Несправжнє стебло: діаметр посередині довжини | малий | 3 |
| 10 | Цибулина: розщеплення на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулинки) | відсутнє | 1 |
| 11 | Цибулина: за розміром | середня | 5 |
| 12 | Цибулина: за висотою, см | середня (3,1-6) | 5 |
| 13 | Цибулина: за діаметром, см | середня (3,1-6) | 5 |
| 14 | Цибулина: відношення висоти до діаметра | середнє | 5 |
| 15 | Цибулина/цибулінка: позиція максимального діаметра | біля основи | 3 |
| 16 | Цибулина/цибулінка: ширина шийки, см | середня (1,1-2) | 5 |
| 17 | Цибулина/цибулінка: основна форма (у поздовжньому розрізі) | округла | 4 |
| 18 | Цибулина: форма плеча верхівки (у поздовжньому розрізі) | злегка зігнута | 1 |
| 19 | Цибулина/цибулінка: форма основи (у поздовжньому розрізі) | округла | 3 |
| 20 | Цибулина: міцність тримання сухої шкірки після збирання | сильна | 7 |
| 21 | Цибулина/цибулінка: товщина сухої шкірки | середня | 5 |
| 22 | Цибулина/цибулінка: основний колір сухої шкірки | червоний | 7 |
| 23 | Цибулина: інтенсивність основного кольору сухої шкірки | помірна | 5 |
| 24 | Цибулина: відтінок кольору сухої шкірки | зеленуватий | 3 |
| 25 | Цибулина: забарвлення соковитих лусок | відсутнє | 1 |
| 26 | Цибулина/цибулінка: кількість зачатків | дуже мало | 1 |
| 27 | Цибулина/цибулінка: вміст сухої речовини | середній | 5 |
| 28 | Рослина: схильність стрілкування за весняного висіву | відсутня або дуже слабка | 1 |
| 29 | Рослина: початок стрілкування за весняної сівби | пізній | 7 |
| 30 | Рослина: схильність до стрілкування за сівби восени | відсутня або дуже слабка | 1 |
| 31 | Рослина: початок стрілкування за сівби восени | пізній | 7 |
| 32 | Рослина: початок збиральної стиглості за сівби восени | дуже ранній | 1 |
| 33 | Час збиральної стиглості за весняного висіву | середній | 5 |
| 34 | Цибулина: початок проростання протягом зберігання | пізній | 7 |
| 35 | Рослина: чоловіча стерильність | відсутня або дуже низька | 1 |