

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 18909171 Назва сорту:** ІКС 259 3М **Заявник (код):** 2260 **Власник сорту (код):** 2260

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 18.12.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 201188**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

| №    | Ознака   | Проявлення                 | Код | Примітка |
|------|--|----------------------------|-----|----------|
| 1    | Перший листок: антоціанове забарвлення піхви   | помірне                    | 5   |          |
| 2    | Перший листок: форма верхівки  | округла                    | 3   |          |
| 3    | Листок: інтенсивність зеленого забарвлення   | помірна                    | 2   |          |
| 4    | Листок: хвилястість краю пластинки   | помірна                    | 2   |          |
| 5    | Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом  | середній                   | 5   |          |
| 6    | Листок: положення пластинки у просторі   | ледь похиле                | 3   |          |
| 7    | Стебло: зигзагоподібність  | слабка                     | 2   |          |
| 8    | Волоть: час цвітіння   | середній                   | 5   |          |
| 9    | Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски  | відсутнє або дуже слабе    | 1   |          |
| 10   | Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи  | слабе                      | 3   |          |
| 11   | Волоть: антоціанове забарвлення пиляків  | помірне                    | 5   |          |
| 12   | Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками  | середній                   | 5   |          |
| 13   | Волоть: положення бічних гілочок у просторі  | ледь похиле                | 3   |          |
| 14   | Волоть: кількість первинних бічних гілочок   | мала                       | 3   |          |
| 15   | Качан: час появи шовку   | від середнього до пізнього | 6   |          |
| 16   | Качан: антоціанове забарвлення шовку   | помірне                    | 5   |          |
| 17   | Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів   | слабе                      | 3   |          |
| 18   | Волоть: розташування колосків за щільністю   | нешільне                   | 3   |          |
| 19   | Листок: антоціанове забарвлення піхви  | відсутнє або дуже слабе    | 1   |          |
| 20   | Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів  | слабе                      | 3   |          |
| 21   | Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)  | коротка                    | 3   |          |
| 22   | Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)   | дуже коротка               | 1   |          |
| 23   | Волоть: бічна гілочка за довжиною  | коротка                    | 3   |          |
| 24,1 | Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною                                     | довга                      | 7   |          |
| 24,2 | Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною | ознака не визначається     | 0   |          |
| 25   | Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини   | мале                       | 3   |          |
| 26   | Листок: пластинка за шириною   | вузька                     | 3   |          |
| 27   | Качан: ніжка за довжиною   | коротка                    | 3   |          |
| 28   | Качан: за довжиною   | середній                   | 5   |          |
| 29   | Качан: діаметр (посередині)  | великий                    | 7   |          |
| 30   | Качан: форма   | конусно-циліндрична        | 2   |          |
| 31   | Качан: кількість зернових рядів  | середня                    | 5   |          |
| 32   | Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен  | ознака не визначається     | 0   |          |
| 33   | Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору   | ознака не визначається     | 0   |          |
| 34   | Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною   | ознака не визначається     | 0   |          |
| 35   | Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною  | ознака не визначається     | 0   |          |
| 36   | Качан: тип зернівки  | зубовидноподібний          | 4   |          |
| 37   | Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок  | ознака не визначається     | 0   |          |
| 38   | Качан: забарвлення верхівки зернівки   | жовто-оранжеве             | 4   |          |
| 39   | За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки   | жовте                      | 3   |          |
| 40   | Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення  | ознака не визначається     | 0   |          |
| 41   | Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня   | відсутнє або дуже слабе    | 1   |          |