

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 16012025 Назва сорту: Трубілон Заявник (код): 2238 Власник сорту (код): 2238

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201105

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

| №  | Ознака  | Проявлення               | Код | Примітка |
|----|---|--------------------------|-----|----------|
| 1  | Колеопиль: інтенсивність антоціанового забарвлення                    | відсутня або дуже слабка | 1   |          |
| 2  | Рослина: габітус (форма куща)   | напіврозлогий            | 5   |          |
| 3  | Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок                     | слабке                   | 3   |          |
| 4  | Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком                      | мала                     | 3   |          |
| 5  | Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)           | середній                 | 5   |          |
| 6  | Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві                           | сильний                  | 7   |          |
| 7  | Колос: восковий наліт   | сильний                  | 7   |          |
| 8  | Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі                        | помірний                 | 5   |          |
| 9  | Рослина: за висотою (стебло і колос)                                  | низька                   | 3   |          |
| 10 | Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом) | слабко виповнена         | 3   |          |
| 11 | Колос: форма (вигляд збоку)   | пірамідальна             | 1   |          |
| 12 | Колос: за щільністю   | середній                 | 5   |          |
| 13 | Колос: за довжиною (без остюків і зубців)                             | середній                 | 5   |          |
| 14 | Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок                        | наявні зубці             | 2   |          |
| 15 | Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною                         | дуже короткі             | 1   |          |
| 16 | Колос: забарвлення  | біле або солом'яно-жовте | 1   |          |
| 17 | Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла                   | помірне                  | 5   |          |
| 18 | Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)  | вузьке                   | 3   |          |
| 19 | Нижня колоскова луска. Плече: за формою                               | округле                  | 2   |          |
| 20 | Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною                            | короткий                 | 3   |          |
| 21 | Нижня колоскова луска. Зубець: за формою                              | середньо зігнутий        | 5   |          |
| 22 | Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні                  | слабке                   | 3   |          |
| 23 | Нижня квіткова луска. Зубець: за формою                               | середньо зігнутий        | 3   |          |
| 24 | Зернівка: забарвлення   | червоне                  | 2   |          |
| 25 | Зернівка: забарвлення у фенолі  | помірне                  | 5   |          |
| 26 | Тип розвитку  | озимий                   | 1   |          |
| 27 | Зернівка: за довжиною   | середня                  | 5   |          |
| 28 | Зернівка: за шириною  | середня                  | 5   |          |
| 29 | Зернівка: відношення довжина / ширина                                 | велике                   | 7   |          |
| 30 | Зернівка: за крупністю  | крупна                   | 7   |          |
| 31 | Язичок: виявлення   | короткий                 | 3   |          |
| 32 | Нижня квіткова луска: кіль  | наявний                  | 9   |          |
| 33 | Вушка: за формою  | гострі                   | 2   |          |
| 34 | Колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні                         | слабке                   | 3   |          |
| 35 | Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)    | яйцеподібна              | 1   |          |

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

| Показник  | Значення |      |      |
|---|----------|------|------|
|   | С        | Л    | П    |
| Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га | 5,11     | 6,49 | 5,76 |
| Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га  | 4,14     | 6,7  | 5,91 |
| +, - до усередненої урожайності, т/га   | -0,97    | 0,21 | 0,15 |
| +, - до усередненої урожайності, %  | -19      | 3,2  | 2,5  |
| Довірчий інтервал, т/га   | 0,06     | 0,06 | 0,04 |
| Тривалість періоду вегетації, діб   | 258      | 264  | 268  |
| Висота рослини, см  | 63       | 70,6 | 70   |
| Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г   | 38       | 44,8 | 43,2 |
| Вміст білка, %  | 13,3     | 13,6 | 12,9 |
| Вміст сирової клейковини, %   | 27,1     | 27,3 | 25,9 |
| Сила борошна (W), о.а.  | 266      | 286  | 238  |
| Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл  | 910      | 900  | 900  |
| Стійкість до вилягання, бал   | 9        | 8    | 9    |
| Стійкість до обсіпання, бал   | 9        | 9    | 8    |
| Стійкість до посухи, бал  | 7        | 8    | 8    |
| Стійкість проти борошнистої роси, бал   | 9        | 8    | 8    |
| Стійкість проти бурої іржі, бал   | 9        | 8    | 8    |
| Стійкість проти фузаріозу колоса, бал   | 9        | 9    | 8    |
| Стійкість проти мухи шведської, бал   | 9        | 8    | 8    |
| Стійкість проти клопа-черепашки, бал  | 8        | 8    | 9    |
| Зимостійкість: польова оцінка, бал  | 8        | 7    | 8    |
| Морозостійкість за проморожування (за даними Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва), бал     |          | 3,0  |      |
| Блок  | 1        | 1    | 1    |
| Напрямок використання   | цїн      | цїн  | ф    |

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.**