

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill

Заявка № 18045038 Назва сорту: ААЦ Інвест 1605 **Заявник (код):** 2536 **Власник сорту (код):** 2536

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201263

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Рослина: тип росту	від напівдетермінантного до індетермінантного	3	
4	Рослина: габітус (характер росту)	напівпрямий	3	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	сіре	1	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	помірна	5	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	сильна	7	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	видовжено-плеската	4	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	жовте	2	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	як у насіннєвій оболонки	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	від дуже раннього до раннього	2	
20	Рослина: час досягання	від дуже раннього до раннього	2	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,59	3	2,75
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	1,41	2,24	2,85
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,18	-0,76	0,1
+, - до усередненої урожайності, %	-11,2	-25,2	3,6
Довірчий інтервал, т/га	0,14	0,17	0,18
Тривалість періоду вегетації, днів	104	105	117
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	145,3	177	171,2
Висота рослини, см	66,9	74	86,3
Висота прикріплення нижнього бобу, см	10,3	13,6	11,8
Стійкість до вилягання, бал	8	6	7
Стійкість до обсипання, бал	7	7	8
Стійкість до посухи, бал	6	7	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	9	6
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	9	8
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	8	6
Стійкість проти септоріозу, бал	9	8	7
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	9	9
Вміст білка, %	38,7	44,5	40,3
Вміст олії, %	22,5	19,4	21,1
Блок (Група стиглості)	6	6	6
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, вл	сбіл, сл	сбіл, сл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.