

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill

Заявка № 18045044 Назва сорту: Райдо Заявник (код): 2430 Власник сорту (код): 2430

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 22.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201821

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| № | Ознака | Проявлення | Код | Примітка |
|----|--|-------------------------------|-----|----------|
| 1 | Гіпокотиль: антоціанове забарвлення | відсутнє | 1 | |
| 2 | Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення | ознака не визначається | 0 | |
| 3 | Рослина: тип росту | індетермінантний | 4 | |
| 4 | Рослина: габітус (характер росту) | напівпрямий | 3 | |
| 5 | Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині) | сіре | 1 | |
| 6 | Рослина: за висотою | середня | 5 | |
| 7 | Листок: пухирчастість | слабка | 3 | |
| 8 | Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка) | широкоюцеподібна | 4 | |
| 9 | Листок: розмір бічного листочка | середній | 5 | |
| 10 | Листок: інтенсивність зеленого забарвлення | помірна | 5 | |
| 11 | Квітка: забарвлення | біле | 1 | |
| 12 | Біб: інтенсивність коричневого забарвлення | слабка | 3 | |
| 13 | Насінина: розмір | середній | 5 | |
| 14 | Насінина: форма | видовжено-плеската | 4 | |
| 15 | Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують) | жовте | 1 | |
| 16 | Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази | ознака не визначена | 0 | |
| 17 | Насінина: забарвлення рубчика | жовте | 2 | |
| 18 | Насінина: забарвлення сім'яної рубчика | інше | 2 | |
| 19 | Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою) | дуже ранній | 1 | |
| 20 | Рослина: час досягання | від дуже раннього до раннього | 2 | |

Результат польових досліджень показників господарської придатності

| Показник | Значення | | |
|---|----------|----------|----------|
| | С | Л | П |
| Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га | 1,59 | 3 | 2,75 |
| Урожайність (за стандартної вологості), т/га | 1,91 | 2,5 | 2,64 |
| +, - до усередненої урожайності, т/га | 0,32 | -0,5 | -0,11 |
| +, - до усередненої урожайності, % | 20 | -16,7 | -4 |
| Довірчий інтервал, т/га | 0,14 | 0,17 | 0,18 |
| Тривалість періоду вегетації, діб | 102 | 99 | 112 |
| Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г | 157,2 | 174,9 | 163 |
| Висота рослини, см | 69,1 | 75,7 | 82 |
| Висота прикріплення нижнього бобу, см | 11,4 | 13,1 | 12,6 |
| Стійкість до вилягання, бал | 9 | 9 | 6 |
| Стійкість до обсіпання, бал | 8 | 8 | 7 |
| Стійкість до посухи, бал | 7 | 8 | 8 |
| Стійкість проти пероноспорозу, бал | 9 | 7 | 6 |
| Стійкість проти аскохітозу, бал | 8 | 9 | 8 |
| Стійкість проти бактеріозу, бал | 8 | 7 | 7 |
| Стійкість проти септоріозу, бал | 9 | 7 | 7 |
| Стійкість проти фузаріозу, бал | 9 | 9 | 9 |
| Вміст білка, % | 34,8 | 38 | 34,7 |
| Вміст олії, % | 23,1 | 21,1 | 22,9 |
| Блок (Група стиглості) | 6 | 6 | 6 |
| Напрямок використання | зерн | зерн | зерн |
| Якість | нбіл, вл | сбіл, сл | нбіл, вл |

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СП.