

**Вид:** Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill

**Заявка № 18045030 Назва сорту:** РЖТ СФІНКСА **Заявник (код):** 1783 **Власник сорту (код):** 1783

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 18.12.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 201262**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Рослина: тип росту	напівдетермінантний	2	
4	Рослина: габітус (характер росту)	напівпрямий	3	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	від низької до середньої	4	
7	Листок: пухирчастість	помірна	5	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренойцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірна	5	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	кулясто-плеската	2	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	сіре	1	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	інше	2	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	від дуже раннього до раннього	2	
20	Рослина: час досягання	від дуже раннього до раннього	2	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,53	3,07	2,48
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	2,17	2,87	3,28
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,64	-0,2	0,8
+, - до усередненої урожайності, %	41,7	-6,6	32,4
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,16	0,16
Тривалість періоду вегетації, днів	115	108	122
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	165,2	201,5	186,2
Висота рослини, см	68	64,4	80,9
Висота прикріплення нижнього бобу, см	7,7	9,1	10
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість до обсіпання, бал	7	9	7
Стійкість до посухи, бал	6	7	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	9	7
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	9	7
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	8	6
Стійкість проти септоріозу, бал	9	8	7
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	9	8
Вміст білка, %	38,6	42,1	39,9
Вміст олії, %	22,9	20,7	21,1
Блок (група стиглості)	7	7	7
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, вл	сбіл, сл	сбіл, сл

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СП.