

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill

Заявка № 18045025 Назва сорту: Чураївна Заявник (код): 1669 Власник сорту (код): 1669

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 22.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201819

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| № | Ознака | Проявлення | Код | Примітка |
|----|--|-----------------------------|-----|----------|
| 1 | Гіпокотиль: антоціанове забарвлення | наявне | 9 | |
| 2 | Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення | помірна | 5 | |
| 3 | Рослина: тип росту | індетермінантний | 4 | |
| 4 | Рослина: габітус (характер росту) | від прямого до напівпрямого | 2 | |
| 5 | Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині) | сіре | 1 | |
| 6 | Рослина: за висотою | середня | 5 | |
| 7 | Листок: пухирчастість | помірна | 5 | |
| 8 | Листок: форма бічного листочка (тричастого листка) | загостренояцеподібна | 3 | |
| 9 | Листок: розмір бічного листочка | середній | 5 | |
| 10 | Листок: інтенсивність зеленого забарвлення | помірна | 5 | |
| 11 | Квітка: забарвлення | фіолетове | 2 | |
| 12 | Біб: інтенсивність коричневого забарвлення | слабка | 3 | |
| 13 | Насінина: розмір | середній | 5 | |
| 14 | Насінина: форма | куляста | 1 | |
| 15 | Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують) | жовте | 1 | |
| 16 | Насінина: забарвлення в насінній оболонці, викликане реакцією пероксидази | ознака не визначена | 0 | |
| 17 | Насінина: забарвлення рубчика | жовте | 2 | |
| 18 | Насінина: забарвлення сім'янки рубчика | як у насінній оболонці | 1 | |
| 19 | Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою) | ранній | 3 | |
| 20 | Рослина: час досягання | від раннього до середнього | 4 | |

Результат польових досліджень показників господарської придатності

| Показник | Значення | | |
|---|----------|----------|----------|
| | С | Л | П |
| Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га | 1,53 | 3,07 | 2,48 |
| Урожайність (за стандартної вологості), т/га | 2,15 | 2,64 | 2,74 |
| +, - до усередненої урожайності, т/га | 0,62 | -0,43 | 0,26 |
| +, - до усередненої урожайності, % | 40,8 | -14 | 10,5 |
| Довірчий інтервал, т/га | 0,12 | 0,16 | 0,16 |
| Тривалість періоду вегетації, днів | 115 | 109 | 124 |
| Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г | 133 | 135,4 | 137,4 |
| Висота рослини, см | 69 | 81,7 | 84,6 |
| Висота прикріплення нижнього бобу, см | 8,1 | 11,8 | 11,1 |
| Стійкість до вилягання, бал | 9 | 9 | 7 |
| Стійкість до обсипання, бал | 8 | 8 | 8 |
| Стійкість до посухи, бал | 7 | 7 | 8 |
| Стійкість проти пероноспорозу, бал | 8 | 8 | 6 |
| Стійкість проти аскохітозу, бал | 9 | 9 | 7 |
| Стійкість проти бактеріозу, бал | 9 | 9 | 7 |
| Стійкість проти септоріозу, бал | 9 | 8 | 7 |
| Стійкість проти фузаріозу, бал | 8 | 9 | 9 |
| Вміст білка, % | 35,8 | 40 | 37,5 |
| Вміст олії, % | 23,8 | 21,3 | 22,5 |
| Блок (група стиглості) | 7 | 7 | 7 |
| Напрямок використання | зерн | зерн | зерн |
| Якість | сбіл, вл | сбіл, сл | сбіл, вл |

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СП.