

Вид: Лобода кіноа *Chenopodium quinoa* Willd.

Заявка № 19661001 Назва сорту: Олімп **Заявник (код):** 2612 **Власник сорту (код):** 2612

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 25.11.2020 **Патент №** 200774

Дата пріоритету: 22.01.2019

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 25.11.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200889

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: вміст сапонінів	середній	2	
2	Листки: забарвлення	світло-зелене	1	
3	Листки: інтенсивність залозистості	середня	5	
4	Листок: розмір	середній	5	
5	Листок: лопатевість краю листкової пластинки	середня	5	
6	Листок: кут основи листкової пластинки	тупий	2	
7	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
8	Стебло: забарвлення	зелене	2	
9	Стебло: наявність смуг	відсутні	1	
10	Стебло: забарвлення смуг	ознака не визначалась	0	
11	Стебло: інтенсивність пігментації пазух листків	відсутня або дуже слабка	1	
12	Волоть: забарвлення під час цвітіння	жовте	3	
13	Рослина: час досягнення	середній	5	
14	Рослина: висота	середня	5	
15	Волоть: забарвлення	світло-жовто-коричневе	1	
16	Волоть: за шільностю	щільна	7	
17	Волоть: за шириною	широка	7	
18	Насіння: забарвлення у плодовій оболонці	світло-коричневе	4	
19	Насіння: забарвлення	сіре	4	
20	Маса 1000 насінин	мала	3	
21	Пагін: наявність беталаїнового забарвлення верхівки	відсутня	1	
22	Волоть: за довжиною	середня	5	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Висота рослини, см – 137,8. Урожайність насіння (за стандартної вологості), т/га – 1,08. Тривалість періоду від сходів до досягнення насіння, діб – 122. Група стигlosti: 2 – середня. Вміст у зерні білка, % – 18,1. Облистяньство, % – 40,7. Маса 1000 насінин, г – 3,2. Стійкість проти: борошнистої роси (*Erysiphe cichoracearum*, *Erysiphe communis* Grev. F.), бал (1–9) – 8, фузаріозної кореневої гнилі (*Fusarium bataticola* Taub., *Pseudomonas radiciperda* Stapp.), бал (1–9) – 6, бурякової та хрестоцвітної блішки (*Phylloptreta Stepheni*, *Chaetocnema Steph.*), бал (1–9) – 5, бобової попелиці (*Aphis fabae* Scop.), бал (1–9) – 6, лучного метелика (*Phyrausta (Loxostege) strictalis* L.), бал (1–9) – 6, бурякових, трав'яних клопів (*Polymerus cognatus* Fieb, *Adelphocoris lineolatus* Geoze), бал (1–9) – 6.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.