

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus L. oleifera*

Заявка № 18040048 Назва сорту: ЕС НАВІГО **Заявник (код):** 806 **Власник сорту (код):** 806

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.10.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200839

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядолі: за довжиною	короткі	3	
3	Сім'ядолі: за шириною	вузькі	3	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	мала	3	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середня	5	
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5	
14	Квітка: пелюстки за шириною	вузькі	3	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5	
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	середня	5	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	короткий	3	
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	середня	5	
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	слабка	3	
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2	3,36	2,47
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,41	2,5	2,71
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,4	-0,87	0,24
+, - до усередненої урожайності, %	20,1	-25,7	9,8
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	281	288	305
Висота рослини, см	123,6	111,6	117,6
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	4,2	4,7	5
Вміст білка, %	21,3	20,9	18,3
Вміст олії, %	45,3	45,2	47,1
Вміст ерукової кислоти, %	0	0	0
Вміст глюкозинолатів, %	0,6	0,8	0,7
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість до обсіпання, бал	8	7	8
Стійкість до посухи, бал	8	8	8
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	6	8
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	8	9	8
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал	7	8	6
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	9	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	8	7
Блок	1	1	1
Напрямок використання	олн	олн	олн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СП.