

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus L. oleifera*
Заявка № 18040028 Назва сорту: СИ ФЛОРІАН **Заявник (код):** 1959 **Власник сорту (код):** 1959
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.10.2020
Свідоцтво про державну реєстрацію № 201223
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядолі: за довжиною	середні	5	
3	Сім'ядолі: за шириною	середні	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	короткий	3	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	вузький	3	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середня	5	
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5	
14	Квітка: пелюстки за шириною	вузькі	3	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7	
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	коротка	3	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5	
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	коротка	3	
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	помірна	5	
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2	3,36	2,47
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,48	3,13	2,62
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,48	-0,25	0,16
+, - до усередненої урожайності, %	23,8	-6,9	6,4
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, дів	280	286	306
Висота рослини, см	120	114,8	108,9
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	4,3	5,1	4,8
Вміст білка, %	20,4	19,8	18,8
Вміст олії, %	46,1	46	46,5
Вміст ерукової кислоти, %	0	0	0,1
Вміст глюкозинолатів, %	0,6	0,7	0,7
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість до обсіпання, бал	8	7	7
Стійкість до посухи, бал	8	9	8
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	7	7
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	8	9	7
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал	7	8	6
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	8	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	8	7
Блок	1	1	1
Напрямок використання	олн	олн	олн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СП.