

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus L. oleifera*

Заявка № 18040040 Назва сорту: Шопен **Заявник (код):** 807 **Власник сорту (код):** 807

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 02.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200986

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| № | Ознака | Проявлення | Код | Примітка |
|----|---|------------------------|-----|----------|
| 1 | Насіння: ерукова кислота | відсутня | 1 | |
| 2 | Сім'ядолі: за довжиною | короткі | 3 | |
| 3 | Сім'ядолі: за шириною | вузькі | 3 | |
| 4 | Листок: інтенсивність зеленого забарвлення | помірна | 5 | |
| 5 | Листок: частки | наявні | 9 | |
| 6 | Листок: кількість часток (повний розвиток листка) | мала | 3 | |
| 7 | Листок: зубчастість краю | помірна | 5 | |
| 8 | Листок: за довжиною (пластинка і черешок) | середній | 5 | |
| 9 | Листок: за шириною (у найширшому місці) | середній | 5 | |
| 10 | Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка | середня | 5 | |
| 11 | Рослина: час початку цвітіння | пізній | 7 | |
| 12 | Квітка: забарвлення пелюсток | жовте | 3 | |
| 13 | Квітка: пелюстки за довжиною | середні | 5 | |
| 14 | Квітка: пелюстки за шириною | вузькі | 3 | |
| 15 | Рослина: утворення пилку | наявне | 9 | |
| 16 | Рослина: за висотою (за повного цвітіння) | висока | 7 | |
| 17 | Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами) | коротка | 3 | |
| 18 | Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком) | середній | 5 | |
| 19 | Стручок: носик за довжиною | середній | 5 | |
| 20 | Стручок: плодоніжка за довжиною | середня | 5 | |
| 21 | Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби | слабка | 3 | |
| 22 | Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби | ознака не визначається | 0 | |

Результат польових досліджень показників господарської придатності

| Показник | Значення | | |
|---|----------|-------|-------|
| | С | Л | П |
| Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га | 2 | 3,36 | 2,47 |
| Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га | 2,1 | 2,9 | 2,75 |
| +, - до усередненої урожайності, т/га | 0,1 | -0,47 | 0,28 |
| +, - до усередненої урожайності, % | 4,6 | -13,9 | 11,5 |
| Довірчий інтервал, т/га | 0,05 | 0,05 | 0,04 |
| Тривалість періоду вегетації, дів | 280 | 285 | 306 |
| Висота рослини, см | 123,7 | 115,4 | 119,4 |
| Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г | 4,3 | 5,1 | 4,9 |
| Вміст білка, % | 20,4 | 20,1 | 18,9 |
| Вміст олії, % | 45,9 | 46,2 | 46,7 |
| Вміст ерукової кислоти, % | 0 | 0 | 0 |
| Вміст глюкозинолатів, % | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Стійкість до вилягання, бал | 8 | 9 | 9 |
| Стійкість до обсипання, бал | 7 | 8 | 7 |
| Стійкість до посухи, бал | 8 | 8 | 8 |
| Зимостійкість: польова оцінка, бал | 8 | 7 | 8 |
| Стійкість проти пильщика ріпакового, бал | 8 | 9 | 8 |
| Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал | 7 | 8 | 6 |
| Стійкість проти бактеріозу, бал | 8 | 9 | 8 |
| Стійкість проти пероноспорозу, бал | 8 | 8 | 7 |
| Блок | 1 | 1 | 1 |
| Напрямок використання | олн | олн | олн |

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СП.