

Вид: Ріпак (ярий) *Brassica napus L. oleifera*

Заявка № 15041011 Назва сорту: ІНВ110 КЛ **Заявник (код):** 2602 **Власник сорту (код):** 2602

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 30.11.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200934

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядоля: за довжиною	коротка	3	
3	Сім'ядоля: за шириною	вузька	3	
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	світлий	3	
5	Листок: наявність часток	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	мало	3	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	короткий	3	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	вузький	3	
10	Сорти тільки з часточковими листками. Листок: довжина черешка	короткий	3	
11	Рослина: час цвітіння	ранній	3	
12	Квітка: колір пелюсток	жовтий	3	
13	Квітка: довжина пелюсток	короткі	3	
14	Квітка: ширина пелюсток	вузькі	3	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5	
17	Рослина: загальна довжина (бічні пагони включно)	середня	5	
18	Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем)	середній	5	
19	Стручок: довжина зубця	короткий	3	
20	Стручок: довжина ніжки	середня	5	
21	Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби	ознака не визначається	0	
22	Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітньої сівби	відсутня або дуже слабка	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		2,03	1,64
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га		1,94	1,58
+, - до усередненої урожайності, т/га		-0,09	-0,06
+, - до усередненої урожайності, %		-4,4	-3,7
Довірчий інтервал, т/га		0,1	0,07
Тривалість періоду вегетації, діб		107	105
Висота рослини, см		108,2	111,2
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г		3,7	4,1
Вміст білка, %		26,9	25,9
Вміст олії, %		41	42,2
Вміст ерукової кислоти, %		0	0
Вміст глюкозинолатів, %		0,6	0,6
Стійкість до вилягання, бал		9	6
Стійкість до обсіпання, бал		7	6
Стійкість до посухи, бал		7	7
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал		9	8
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал		7	7
Стійкість проти бактеріозу, бал		9	7
Стійкість проти пероноспорозу, бал		8	7
Блок		1	1
Напрямок використання		олн	олн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.