

Вид: Ріпак (ярий) *Brassica napus L. oleifera*

Заявка № 18041004 Назва сорту: Караміно КЛ Заявник (код): 912 Власник сорту (код): 912

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201229

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядоля: за довжиною	середня	5	
3	Сім'ядоля: за шириною	вузька	3	
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірний	5	
5	Листок: наявність часток	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня кількість	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	довгий	7	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	широкий	7	
10	Сорти тільки з часточковими листками. Листок: довжина черешка	довгий	7	
11	Рослина: час цвітіння	середній	5	
12	Квітка: колір пелюсток	жовтий	3	
13	Квітка: довжина пелюсток	довгі	7	
14	Квітка: ширина пелюсток	широкі	7	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7	
17	Рослина: загальна довжина (бічні пагони включно)	довга	7	
18	Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем)	довгий	7	
19	Стручок: довжина зубця	середній	5	
20	Стручок: довжина ніжки	довга	7	
21	Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби	ознака не визначається	0	
22	Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітньої сівби	відсутня або дуже слабка	1	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		2,03	1,64
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га		2,01	1,78
+, - до усередненої урожайності, т/га		-0,02	0,14
+, - до усередненої урожайності, %		-0,8	8,6
Довірчий інтервал, т/га		0,1	0,07
Тривалість періоду вегетації, дів		113	102
Висота рослини, см		102	116,5
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г		4,6	4,2
Вміст білка, %		23,8	23,8
Вміст олії, %		43,9	44,7
Вміст ерукової кислоти, %		0	0
Вміст глюкозинолатів, %		0,7	0,6
Стійкість до вилягання, бал		8	6
Стійкість до обсіпання, бал		7	7
Стійкість до посухи, бал		7	8
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал		9	8
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал		7	6
Стійкість проти бактеріозу, бал		8	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал		8	8
Блок		1	1
Напрямок використання		олн	олн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.