

Вид: Картопля *Solanum tuberosum* L.**Заявка № 18088018 Назва сорту:** 7 ФОР 7 **Заявник (код):** 801 **Власник сорту (код):** 801**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 30.11.2020**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200882****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Світловий паросток: розмір	середній	5	
2	Світловий паросток: форма	широкоциліндрична	4	
3	Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи	сильна	7	
4	Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні основи	середнє	2	
5	Світловий паросток: опушення основи	помірне	5	
6	Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою	мала	3	
7	Світловий паросток: форма верхівки	закрита	1	
8	Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки	слабке	3	
9	Світловий паросток: опушення верхівки	слабке	3	
10	Світловий паросток: кількість кореневих кінчиків	середня кількість	5	
11	Світловий паросток: бічні пагони за довжиною	короткі	3	
12	Рослина: тип розвитку	проміжний	2	
13	Рослина: габітус	напіврозлогий	5	
14	Стебло: антоціанове забарвлення	помірне	5	
15	Листок: загальний розмір	середній	5	
16	Листок: за відкритістю	проміжний	3	
17	Листок: виявлення вторинних листочків	слабке	3	
18	Листок: зелене забарвлення	помірне	5	
19	Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці	слабке	3	
20	Друга пара бічних листочків: розмір	дуже великий	9	
21	Друга пара бічних листочків: за ширину	вузькі	3	
22	Верхівкові і бічні листочки: частота зрошення	рідко	3	
23	Листочек: хвилястість краю	помірна	5	
24	Листочек: загиблення жилок	глибоке	7	
25	Листочек: глянсуватість верхнього боку	глянсуватий	7	
26	Листочек: опушення пластинки на верхівці розетки	наявне	9	
27	Бутон: антоціанове забарвлення	слабке	3	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: рясність цвітіння	обрідне	3	
30	Суцвіття: розмір	середній	5	
31	Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки	помірне	5	
32	Віночок квітки: розмір	середній	5	
33	Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення внутрішнього боку	помірна	5	
34	Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні внутрішнього боку	відсутнє або мале	1	
35	Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці	велике	7	
36	Рослина: час достигання	ранній	3	
37	Бульба: форма	короткоovalна	2	
38	Бульба: вічка за глибину	мілкі	3	
39	Бульба: забарвлення шкірки	жовте	2	
40	Бульба: забарвлення основи вічка	жовте	2	
41	Бульба: забарвлення м'якоті	біле	1	
42	Лиші сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою. Бульба: антоціанове забарвлення шкірки під впливом світла	відсутнє або дуже слабке	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	22,92	20,87	
урожайність, т/га	23,4	17,59	
+ - до усередненої урожайності, т/га	0,48	-3,28	
+ - до усередненої урожайності, %	2,1	-15,7	
Довірчий інтервал, т/га	4,16	2,49	
Тривалість періоду вегетації, діб	95	80	
Середня маса товарної бульби, г	94,6	99,8	
Вміст крохмалю, %	14,3	13,3	
Збір крохмалю, т/га	37,8	26,6	
Вміст сухої речовини, %	21,8	20,2	
Дегустаційна оцінка, бал	6	4	
Придатність до механізованого збирання, бал	9	9	
Лежкість, бал	7	8	
Товарність бульб, %	76,1	88,5	
Стійкість проти макроспоріозу, бал	7	9	
Стійкість проти фітофторозу, бал	4	3	
Стійкість до звичайного патотипу раку, 1 - нестійкий, 9 - стійкий, бал	9	9	
Блок (Група стигlosti)	7	7	
Напрям використання	СТЛ	СТЛ	
Якість	СК	СК	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.