

Вид: Картопля *Solanum tuberosum* L.

Заявка № 18088021 Назва сорту: ПАРАДІЗО Заявник (код): 1652 Власник сорту (код): 1652

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 04.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201019

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Світловий паросток: розмір	великий	7	
2	Світловий паросток: форма	конічна	3	
3	Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи	слабка	3	
4	Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні основи	відсутнє або дуже мале	1	
5	Світловий паросток: опущення основи	слабке	3	
6	Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою	мала	3	
7	Світловий паросток: форма верхівки	закрита	1	
8	Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки	помірне	5	
9	Світловий паросток: опущення верхівки	слабке	3	
10	Світловий паросток: кількість кореневих кінчиків	мало	3	
11	Світловий паросток: бічні пагони за довжиною	короткі	3	
12	Рослина: тип розвитку	стебловий	1	
13	Рослина: габітус	прямий	3	
14	Стебло: антоціанове забарвлення	сильне	7	
15	Листок: загальний розмір	малий	3	
16	Листок: за відкритістю	закритий	1	
17	Листок: виявлення вторинних листочків	слабке	3	
18	Листок: зелене забарвлення	помірне	5	
19	Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці	помірне	5	
20	Друга пара бічних листочків: розмір	дуже великий	9	
21	Друга пара бічних листочків: за ширину	середні	5	
22	Верхівкові і бічні листочки: частота зрощення	середньо	5	
23	Листочек: хвильистість краю	відсутня або дуже слабка	1	
24	Листочек: заглиблення жилок	середнє	5	
25	Листочек: глянсуватись верхнього боку	не глянсуватий	3	
26	Листочек: опущення пластинки на верхівці розетки	наявне	9	
27	Бутон: антоціанове забарвлення	середнє	5	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: рясність цвітіння	рясне	7	
30	Суцвіття: розмір	середній	5	
31	Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки	помірне	5	
32	Віночок квітки: розмір	великий	7	
33	Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення внутрішнього боку	помірна	5	
34	Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні внутрішнього боку	відсутнє або мале	1	
35	Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці	середнє	5	
36	Рослина: час достигання	середній	5	
37	Бульба: форма	овальна	3	
38	Бульба: вічка за глибиною	мілкі	3	
39	Бульба: забарвлення шкірки	жовте	2	
40	Бульба: забарвлення основи вічка	жовте	2	
41	Бульба: забарвлення мякоті	світло-жовте	3	
42	Лише сорти із світло-бежевою і жовою шкіркою. Бульба: антоціанове забарвлення шкірки під впливом світла	сильне	7	

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		22,96	19,03
Урожайність, т/га		26,41	28,7
+,- до усередненої урожайності, т/га		3,45	9,67
+,- до усередненої урожайності, %		15	50,8
Довірчий інтервал, т/га		1,7	0,73
Тривалість періоду вегетації, діб		109	96
Середня маса товарної бульби, г		99	99,3
Вміст крохмалю, %		13,9	11,5
Збір крохмалю, т/га		37,2	33,2
Вміст сухої речовини, %		21,2	18,4
Дегустаційна оцінка, бал		7	5
Придатність до механізованого збирання, бал		8	9
Лежкість, бал		7	9
Товарність бульб, %		76,6	89,3
Стійкість проти макроспоріозу, бал		7	9
Стійкість проти фітофторозу, бал		7	6
Стійкість до звичайного патотипу раку, 1 - нестійкий, 9 - стійкий, бал		9	9
Блок (група стиглості)		8	8
Напрям використання	СТЛ	СТЛ	
Якість	СК	НК	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.