

Вид: Картопля *Solanum tuberosum* L.

Заявка № 19088001 Назва сорту: Шері Заявник (код): 2584 Власник сорту (код): 2584

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 01.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200970

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Світловий паросток: розмір	малий	3	
2	Світловий паросток: форма	яйцеподібна	2	
3	Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи	дуже сильна	9	
4	Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні основи	середнє	2	
5	Світловий паросток: опущення основи	сильне	7	
6	Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою	середня	5	
7	Світловий паросток: форма верхівки	закрита	1	
8	Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки	помірне	5	
9	Світловий паросток: опущення верхівки	помірне	5	
10	Світловий паросток: кількість кореневих кінчиків	мало	3	
11	Світловий паросток: бічні пагони за довжиною	короткі	3	
12	Рослина: тип розвитку	листковий	3	
13	Рослина: габітус	напіврозлогий	5	
14	Стебло: антоціанове забарвлення	сильне	7	
15	Листок: загальний розмір	середній	5	
16	Листок: за відкритістю	проміжний	3	
17	Листок: виявлення вторинних листочків	помірне	5	
18	Листок: зелене забарвлення	помірне	5	
19	Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці	сильне	7	
20	Друга пара бічних листочків: розмір	дуже великий	9	
21	Друга пара бічних листочків: за ширину	середні	5	
22	Верхівкові і бічні листочки: частота зрощення	середньо	5	
23	Листочек: хвильистість краю	слабка	3	
24	Листочек: заглиблення жилок	середнє	5	
25	Листочек: глянсуватись верхнього боку	глянсуватий	7	
26	Листочек: опущення пластинки на верхівці розетки	наявне	9	
27	Бутон: антоціанове забарвлення	слабке	3	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: рясність цвітіння	відсутнє або дуже обрідне	1	
30	Суцвіття: розмір	середній	5	
31	Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки	сильне	7	
32	Віночок квітки: розмір	великий	7	
33	Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення внутрішнього боку	помірна	5	
34	Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні внутрішнього боку	відсутнє або мале	1	
35	Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці	середнє	5	
36	Рослина: час достигання	ранній	3	
37	Бульба: форма	дуже видовжена	6	
38	Бульба: вічка за глибиною	дуже мілкі	1	
39	Бульба: забарвлення шкірки	червоне	3	
40	Бульба: забарвлення основи вічка	червоне	3	
41	Бульба: забарвлення мякоті	частково червоне	7	
42	Лише сорти із світло-бежевою і жовою шкіркою. Бульба: антоціанове забарвлення шкірки під впливом світла	ознака не визначається	0	

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		22,92	20,87
Урожайність, т/га		25,14	17,81
+,- до усередненої урожайності, т/га		2,22	-3,06
+,- до усередненої урожайності, %		9,7	-14,7
Довірчий інтервал, т/га		4,16	2,49
Тривалість періоду вегетації, діб		92	78
Середня маса товарної бульби, г		71,4	73,2
Вміст крохмалю, %		17	15,3
Збір крохмалю, т/га		47,2	31,8
Вміст сухої речовини, %		25,5	22,8
Дегустаційна оцінка, бал		6	5
Придатність до механізованого збирання, бал		8	9
Лежкість, бал		8	9
Товарність бульб, %		75,9	88
Стійкість проти макроспоріозу, бал		7	8
Стійкість проти фітофторозу, бал		6	3
Стійкість до звичайного патотипу раку, 1 - нестійкий, 9 - стійкий, бал		9	9
Блок (група стиглості)		7	7
Напрям використання	СТЛ	СТЛ	
Якість	ПК	СК	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.