

Вид: Буряк столовий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *conditiva* Alef.

Заявка № 18122002 Назва сорту: Бреско **Заявник (код):** 751 **Власник сорту (код):** 751

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.11.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200856

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Супліддя	одноросткове	1	
2	Паросток: червоне забарвлення гіпокотилія	наявне	9	
3	Листок: положення черешка	пряме	1	
4	Листок: положення пластинки	напівпряме	3	
5	Листок: за довжиною (включно з черешком)	короткий	3	
6	Листкова пластинка: за довжиною	коротка	3	
7	Листкова пластинка: за шириною	вузька	3	
8	Листкова пластинка: форма	еліптична	5	
9	Листкова пластинка: забарвлення	в основному зелене	1	
10	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Листкова пластинка: червоне забарвлення жилок	сильне	7	
12	Листкова пластинка: хвилястість краю	помірна	5	
13	Листкова пластинка: пухирчастість	помірна	5	
14	Листковий черешок: за шириною основи (біля місця прикріплення до кореня)	середній	5	
15	Листковий черешок: основний забарвлення зворотнього боку	пурпурове	4	
16	Коренеплід: заглиблення у ґрунт	середнє	5	
17	Коренеплід: форма поздовжнього розрізу	округла	3	
18	Коренеплід: за довжиною	короткий	3	
19	Коренеплід: за шириною	вузький	3	
20	Коренеплід: відношення довжина / ширина	середнє	3	
21	Коренеплід: форма кінчика	загострена	1	
22	Коренеплід: окорковіння шкірки	слабке	3	
23	Коренеплід: зовнішнє забарвлення	бордове	4	
24	Коренеплід: основне забарвлення м'якоті	пурпурове	4	
25	Коренеплід: інтенсивність основного забарвлення м'якоті	помірна	5	
26	Коренеплід: виявлення кілець	помірне	5	
27	Тенденція до стрілкування (за ранньої сівби)	відсутня або дуже слабка	1	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 87. Товарна врожайність, т/га – 82. Маса товарного коренеплоду, г – 210. Вміст сухої речовини в плоді, % – 12,5, загального цукру, % – 8,5.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.