

**Вид:** Капуста білоголова *Brassica oleracea* L. var. *alba* DC.

**Заявка № 18096013 Назва сорту:** КІЛАСІС **Заявник (код):** 1959 **Власник сорту (код):** 1959

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 08.12.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 201157**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

| №    | Ознака  | Проявлення                 | Код | Примітка |
|------|---|----------------------------|-----|----------|
| 1,1  | Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: за висотою  | висока                     | 7   |          |
| 1,2  | Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: за висотою                                     | ознака не визначається     | 0   |          |
| 1,3  | Лише для сортів капусти савойської. Рослина: за висотою   | ознака не визначається     | 0   |          |
| 2,1  | Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: найбільший діаметр (разом із зовнішніми листками) | середній                   | 5   |          |
| 2,2  | Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)                | ознака не визначається     | 0   |          |
| 2,3  | Лише для сортів капусти савойської. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)                    | ознака не визначається     | 0   |          |
| 3    | Рослина: зовнішнє стебло за довжиною  | коротке                    | 3   |          |
| 4    | Рослина: положення зовнішніх листків  | напівпряме                 | 3   |          |
| 5,1  | Лише для сортів капусти білоголової. Зовнішній листок: розмір                                   | середній                   | 5   |          |
| 5,2  | Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: розмір                                | ознака не визначається     | 0   |          |
| 5,3  | Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір                                    | ознака не визначається     | 0   |          |
| 6    | Зовнішній листок: форма пластинки   | поперечноширокоеліптична   | 4   |          |
| 7    | Зовнішній листок: профіль верхньої частини пластинки  | увігнутий                  | 1   |          |
| 8,1  | Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості   | відсутній або дуже слабкий | 1   |          |
| 8,2  | Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості                     | ознака не визначається     | 0   |          |
| 9,1  | Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: розмір пухирців         | середній                   | 5   |          |
| 9,2  | Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір пухирців                           | ознака не визначається     | 0   |          |
| 10   | Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: гофрованість                              | ознака не визначається     | 0   |          |
| 11   | Зовнішній листок: забарвлення (з восковим нальотом)   | сіро-зелене                | 3   |          |
| 12   | Зовнішній листок: інтенсивність забарвлення   | помірна                    | 5   |          |
| 13   | Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: зеленкуватість                        | ознака не визначається     | 0   |          |
| 14   | Зовнішній листок: восковий наліт  | сильний                    | 7   |          |
| 15   | Зовнішній листок: ступінь хвилястості краю  | слабкий                    | 3   |          |
| 16   | Зовнішній листок: вигин краю  | відсутній                  | 1   |          |
| 17   | Головка: форма поздовжнього розрізу   | округла                    | 3   |          |
| 18   | Головка: форма основи у поздовжньому розрізі  | округла                    | 1   |          |
| 19   | Головка: за довжиною  | середня                    | 5   |          |
| 20   | Головка: діаметр  | середній                   | 5   |          |
| 21   | Головка: розміщення найбільшого діаметра  | посередині                 | 2   |          |
| 22   | Головка: ступінь покриття   | покритий                   | 3   |          |
| 23   | Лише для сортів капусти савойської. Головка: пухирчастість покривного листка                    | ознака не визначається     | 0   |          |
| 24   | Головка: вигин краю покривного листка   | наявний                    | 9   |          |
| 25   | Головка: забарвлення покривного листка  | сіро-зелене                | 3   |          |
| 26   | Головка: інтенсивність забарвлення покривного листка  | помірна                    | 5   |          |
| 27   | Лише сорти капусти білоголової і савойської. Головка: антоціанове забарвлення покривних листків | відсутнє або дуже слабке   | 1   |          |
| 28   | Головка: внутрішнє забарвлення  | білувате                   | 1   |          |
| 29   | Лише сорти капусти червоноголової. Головка: інтенсивність внутрішнього забарвлення              | ознака не визначається     | 0   |          |
| 30   | Головка: за щільністю   | дуже щільна                | 9   |          |
| 31   | Головка: внутрішня структура  | тонка                      | 3   |          |
| 32   | Головка: довжина внутрішнього стебла відносно довжини головки                                   | середня                    | 5   |          |
| 33,1 | Лише сорти капусти білоголової. Час збиральної стиглості  | пізній                     | 7   |          |
| 33,2 | Лише сорти капусти червоноголової. Час збиральної стиглості                                     | ознака не визначається     | 0   |          |
| 33,3 | Лише сорти капусти савойської. Час збиральної стиглості   | ознака не визначається     | 0   |          |
| 34   | Час розтріскування головки після досягання  | пізній                     | 7   |          |
| 35   | Чоловіча стерильність   | ознака не визначалась      | 0   |          |
| 36   | Стійкість до раси 1 <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>conglutinans</i>                        | ознака не визначалась      | 0   |          |

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 160. Вміст вітаміну С, мг % – 50, загального цукру, % – 4, сухої речовини, % – 8. Стійкість до хвороб, балів (1–9): бактеріоз слизивий – 5, бактеріоз судинний – 5.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛ.