

Вид: Капуста білоголова *Brassica oleracea* L. var. *alba* DC.

Заявка № 18096004 Назва сорту: Тропікана **Заявник (код):** 1852 **Власник сорту (код):** 1852

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 25.11.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200873

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| № | Ознака | Проявлення | Код | Примітка |
|------|---|--------------------------|-----|----------|
| 1,1 | Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: за висотою | дуже висока | 9 | |
| 1,2 | Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: за висотою | ознака не визначається | 0 | |
| 1,3 | Лише для сортів капусти савойської. Рослина: за висотою | ознака не визначається | 0 | |
| 2,1 | Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: найбільший діаметр (разом із зовнішніми листками) | середній | 5 | |
| 2,2 | Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1) | ознака не визначається | 0 | |
| 2,3 | Лише для сортів капусти савойської. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1) | ознака не визначається | 0 | |
| 3 | Рослина: зовнішнє стебло за довжиною | коротке | 3 | |
| 4 | Рослина: положення зовнішніх листків | напівпряме | 3 | |
| 5,1 | Лише для сортів капусти білоголової. Зовнішній листок: розмір | великий | 7 | |
| 5,2 | Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: розмір | ознака не визначається | 0 | |
| 5,3 | Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір | ознака не визначається | 0 | |
| 6 | Зовнішній листок: форма пластинки | округла | 3 | |
| 7 | Зовнішній листок: профіль верхньої частини пластинки | увігнутий | 1 | |
| 8,1 | Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості | помірний | 2 | |
| 8,2 | Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості | ознака не визначається | 0 | |
| 9,1 | Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: розмір пухирців | середній | 5 | |
| 9,2 | Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір пухирців | ознака не визначається | 0 | |
| 10 | Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: гофрованість | ознака не визначається | 0 | |
| 11 | Зовнішній листок: забарвлення (з восковим нальотом) | сіро-зелене | 3 | |
| 12 | Зовнішній листок: інтенсивність забарвлення | помірна | 5 | |
| 13 | Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: зеленкуватість | ознака не визначається | 0 | |
| 14 | Зовнішній листок: восковий наліт | сильний | 7 | |
| 15 | Зовнішній листок: ступінь хвилястості краю | слабкий | 3 | |
| 16 | Зовнішній листок: вигин краю | наявний | 9 | |
| 17 | Головка: форма поздовжнього розрізу | округла | 3 | |
| 18 | Головка: форма основи у поздовжньому розрізі | округла | 1 | |
| 19 | Головка: за довжиною | середня | 5 | |
| 20 | Головка: діаметр | середній | 5 | |
| 21 | Головка: розміщення найбільшого діаметра | посередині | 2 | |
| 22 | Головка: ступінь покриття | покритий | 3 | |
| 23 | Лише для сортів капусти савойської. Головка: пухирчастість покривного листка | ознака не визначається | 0 | |
| 24 | Головка: вигин краю покривного листка | наявний | 9 | |
| 25 | Головка: забарвлення покривного листка | сіро-зелене | 3 | |
| 26 | Головка: інтенсивність забарвлення покривного листка | помірна | 5 | |
| 27 | Лише сорти капусти білоголової і савойської. Головка: антоціанове забарвлення покривних листків | відсутнє або дуже слабке | 1 | |
| 28 | Головка: внутрішнє забарвлення | білувате | 1 | |
| 29 | Лише сорти капусти червоноголової. Головка: інтенсивність внутрішнього забарвлення | ознака не визначається | 0 | |
| 30 | Головка: за щільністю | щільна | 7 | |
| 31 | Головка: внутрішня структура | тонка | 3 | |
| 32 | Головка: довжина внутрішнього стебла відносно довжини головки | середня | 5 | |
| 33,1 | Лише сорти капусти білоголової. Час збиральної стиглості | середній | 5 | |
| 33,2 | Лише сорти капусти червоноголової. Час збиральної стиглості | ознака не визначається | 0 | |
| 33,3 | Лише сорти капусти савойської. Час збиральної стиглості | ознака не визначається | 0 | |
| 34 | Час розтріскування головки після досягання | пізній | 7 | |
| 35 | Чоловіча стерильність | ознака не визначалась | 0 | |
| 36 | Стійкість до раси 1 <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>conglutinans</i> | ознака не визначалась | 0 | |

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 80. Період від сівби до початку досягання, діб – 90. Вміст вітаміну С, мг % – 42, загального цукру, % – 4,5, сухої речовини, % – 11. Стійкість до хвороб, балів (1–9): бактеріоз слизовий – 5, бактеріоз судинний – 6.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.