

Вид: Капуста броколі *Brassica oleracea* L. convar. *botrytis* (L.) Alef. var. *cymosa* Duch.

Заявка № 19136001 Назва сорту: Вавілон **Заявник (код):** 2020 **Власник сорту (код):** 2020

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201272

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| № | Ознака | Проявлення | Код | Примітка |
|----|---|---------------------------|-----|----------|
| 1 | Рослина: кількість стебел | одне | 1 | |
| 2 | Рослина: за висотою (за збиральної стиглості) | низька | 3 | |
| 3 | Листок: положення (на початку формування головки) | горизонтальне | 5 | |
| 4 | Листок: за довжиною (включаючи черешок) | короткий | 3 | |
| 5 | Листок: за шириною | середній | 5 | |
| 6 | Листок: кількість часток | середня | 5 | |
| 7 | Листкова пластинка: забарвлення | сіро-зелене | 2 | |
| 8 | Листкова пластинка: інтенсивність забарвлення | слабка | 3 | |
| 9 | Листкова пластинка: антоціанове забарвлення | наявне | 9 | |
| 10 | Листкова пластинка: хвилястість краю | помірна | 5 | |
| 11 | Листкова пластинка: зубчастість краю | помірна | 5 | |
| 12 | Листкова пластинка: пухирчастість | слабка | 3 | |
| 13 | Черешок: антоціанове забарвлення | наявне | 9 | |
| 14 | Черешок: за довжиною | короткий | 3 | |
| 15 | Головка: галузки від основи за довжиною (за виключенням стебла) | короткі | 3 | |
| 16 | Головка: розмір | середній | 5 | |
| 17 | Головка: форма поздовжнього розрізу | поперечношироко-еліптична | 2 | |
| 18 | Головка: забарвлення | сіро-зелене | 3 | |
| 19 | Головка: інтенсивність забарвлення | слабка | 3 | |
| 20 | Головка: антоціанове забарвлення | наявне | 9 | |
| 21 | Головка: інтенсивність антоціанового забарвлення | сильна | 7 | |
| 22 | Головка: горбкуватість | помірна | 5 | |
| 23 | Головка: структура тканини | м'яка | 3 | |
| 24 | Головка: за щільністю | щільна | 7 | |
| 25 | Головка: покривний листок | відсутній | 1 | |
| 26 | Рослина: вторинні головки (за збирання) | наявні | 9 | |
| 27 | Рослина: опуклість вторинних головок (як для озн. 26) | помірна | 5 | |
| 28 | Квітка: забарвлення | жовте | 2 | |
| 29 | Квітка: інтенсивність жовтого забарвлення | помірна | 5 | |
| 30 | Час збиральної стиглості (50% рослин) | середній | 5 | |
| 31 | Час початку цвітіння (50% рослин мають щонайменше 10% квіток) | пізній | 7 | |
| 32 | Чоловіча стерильність | наявна | 9 | |

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 20. Тривалість періоду до досягання, діб – 75. Стійкість до хвороб, балів (1–9): бактеріоз судинний – 6.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.