

Вид: Салат посівний листовий *Lactuca sativa* L. var. *secalina*

Заявка № 19120010 Назва сорту: Вишиванка **Заявник (код):** 1708 **Власник сорту (код):** 1708

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 17.11.2020 **Патент №** 200720

Дата пріоритету: 12.09.2019

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 17.11.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200937

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| № | Ознака | Проявлення | Код | Примітка |
|----|---|-------------------------|-----|----------|
| 1 | Насінина: забарвлення | чорне | 3 | |
| 2 | Сіянець: антоціанове забарвлення | наявне | 9 | |
| 3 | Сіянець: сім'ядолі за розміром (за повного розвитку) | середні | 5 | |
| 4 | Сіянець: форма сім'ядолей | широкоеліптична | 7 | |
| 5 | Листок: положення у стадії 10-12 листків | напівпряме | 3 | |
| 6 | Листкова пластинка: за розсіченістю краю (як для 5) | розчленована | 3 | |
| 7 | Рослина: діаметр | середній | 5 | |
| 8 | Рослина: утворення головки | не утворює | 1 | |
| 9 | Тільки сорти із закритою головою. Головка: перекриття верхньої частини листків | ознака не визначається | 0 | |
| 10 | Головка: за щільністю | ознака не визначається | 0 | |
| 11 | Головка: розмір | ознака не визначається | 0 | |
| 12 | Лише для сортів маслянистоголовчастого типу у теплицях. Головка: закриття основи | ознака не визначається | 0 | |
| 13 | Головка: форма позаднього розрізу | ознака не визначається | 0 | |
| 14 | Листок: за товщиною | середній | 5 | |
| 15 | Листок: положення за збиральною стиглості (зовнішні листки у головчастого салату або сформовані листки для листового і стеблового салату) | напівпряме | 3 | |
| 16 | Листок: форма | широкоромбоподібна | 8 | |
| 17 | Листок: форма верхівки | тупа | 2 | |
| 18 | Листок: відтінок зеленого забарвлення зовнішніх листків | червонуватий | 4 | |
| 19 | Листок: інтенсивність забарвлення зовнішніх листків | сильна | 7 | |
| 20 | Листок: антоціанове забарвлення | наявне | 9 | |
| 21 | Листок: інтенсивність антоціанового забарвлення | сильна | 7 | |
| 22 | Листок: поширення антоціанового забарвлення | суцільне | 2 | |
| 23 | Листок: тип поширення антоціанового забарвлення | тільки дифузне | 1 | |
| 24 | Листок: глянуватість верхнього боку | помірна | 5 | |
| 25 | Листок: пухирчастість | слабка | 3 | |
| 26 | Листок: розмір пухирів | малий | 3 | |
| 27 | Листкова пластинка: хвилястість краю | помірна | 5 | |
| 28 | Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки | відсутня | 1 | |
| 29 | Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки за глибиною | ознака не визначається | 0 | |
| 30 | Листкова пластинка: ступінь розсіченості краю верхівки | ознака не визначається | 0 | |
| 31 | Тільки сорти з мілкою розсіченістю краю верхівки. Листкова пластинка: тип розсіченості | ознака не визначається | 0 | |
| 32 | Листкова пластинка: жилкування | невіялоподібне | 1 | |
| 33 | Пазушне жилкування | відсутнє або дуже слабе | 1 | |
| 34 | Час збиральної стиглості | середній | 5 | |
| 35 | Час початку з'явлення квітконоса в умовах довгого дня | середній | 5 | |
| 36 | Рослина: за висотою (квітуча рослина) | середня | 5 | |
| 37 | Рослина: фасціація (під час цвітіння) | відсутня | 1 | |
| 38 | Стебло: інтенсивність фасціації (під час цвітіння) | ознака не визначається | 0 | |
| 39 | Стійкість проти борошнистої роси (<i>Bremia lactucae</i>) Izolate B1:16 | наявна | 9 | |
| 40 | Стійкість проти вірусу мозаїки салату (LMV) Патотип Ls 1 | наявна | 9 | |
| 41 | Стійкість проти попелиці (види <i>Aphis gossypii</i> , <i>A. fabae</i> , <i>Myzodes persicae</i>) | наявна | 9 | |
| 42 | Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lactucae</i> | стійкий (наявна) | 9 | |

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 16,5. Тривалість періоду до достигання, дів – 37.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.