

Вид: Салат посівний стебловий *Lactuca sativa L. var. angustana***Заявка № 19518001 Назва сорту:** Лелека **Заявник (код):** 1708 **Власник сорту (код):** 1708**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 17.11.2020 **Патент №** 200721**Дата пріоритету:** 12.09.2019**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 17.11.2020**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 200939**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насінина: забарвлення	біле	1	
2	Сіянець: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
3	Сіянець: сім'ядолі з розміром (за повного розвитку)	середні	5	
4	Сіянець: форма сім'ядолей	еліптична	5	
5	Листок: положення у стадії 10-12 листків	розлоге	5	
6	Листкова пластинка: за розсіченістю краю (як для 5)	нерозсічена	1	
7	Рослина: діаметр	великий	7	
8	Рослина: утворення головки	не утворює	1	
9	Тільки сорти із закритою головкою. Головка: ступінь перекриття верхньої частини листків	ознака не визначається	0	
10	Головка: за щільністю	ознака не визначається	0	
11	Головка: розмір	ознака не визначається	0	
12	Лише для сортів маслянисто-головчастого типу у теплицях. Головка: закриття основи	ознака не визначається	0	
13	Головка: форма поздовжнього розрізу	ознака не визначається	0	
14	Листок: за товщиною	середній	5	
15	Листок: положення за збиравальної стиглості (зовнішні листки у головчастого салату або сформовані листки для листкового і стеблового салатів	горизонтальне	5	
16	Листок: форма	вузькоеліптична	1	
17	Листок: форма верхівки	гостра	1	
18	Листок: відтінок зеленого забарвлення зовнішніх листків	жовтуватий	2	
19	Листок: інтенсивність забарвлення зовнішніх листків	світласлабока	3	
20	Листок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
21	Листок: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
22	Листок: поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
23	Листок: тип поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
24	Листок: глянсуватість верхнього боку	слабка	3	
25	Листок: пухирчастість	помірна	5	
26	Листок: розмір пухирів	середній	5	
27	Листкова пластинка: хвилястість краю	слабка	3	
28	Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки	відсутня	1	
29	Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки за глибиною	ознака не визначається	0	
30	Листкова пластинка: ступінь розсіченості краю верхівки	ознака не визначається	0	
31	Тільки сорти з мілкою розсіченістю краю верхівки. Листкова пластинка: тип розсіченості	ознака не визначається	0	
32	Листкова пластинка: жилкування	невіялоподібне	1	
33	Пазушне глікування	відсутнє або дуже слабке	1	
34	Час збиравальної стиглості	середній	5	
35	Час початку з'явлення квітконоса в умовах довгого дня	пізній	7	
36	Рослина: за висотою (квітуюча рослина)	висока	7	
37	Рослина: фасція (під час цвітіння)	відсутня	1	
38	Стебло: інтенсивність фасції (під час цвітіння)	ознака не визначається	0	
39	Стійкість до борошнистої роси (<i>Bremia lactucae</i>) Izolate B1:16	наявна	9	
40	Стійкість проти вірусу мозаїки салату (LMV) Патотип Ls 1	наявна	9	
41	Стійкість проти попелиць (види <i>Aphis gossypii</i> , <i>A. fabae</i> , <i>Myzodes persicae</i>)	наявна	9	
42	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lactucae</i>	стійкий (наявна)	9	

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Товарна врожайність, т/га – 35,6. Тривалість періоду до досягнення, діб – 65. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): несправжня борошниста роса – 9, борошниста роса – 7, біла гниль – 9, септоріоз – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.