

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 12007007 Назва сорту: Шпалівка **Заявник (код):** 1543 **Власник сорту (код):** 1543

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 21.01.2018 **Патент № 180458**

Дата пріоритету: 21.02.2012

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 08.02.2016

Свідоцтво про державну реєстрацію № 160221

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| № | Ознака | Проявлення | Код |
|----|---|--------------------------|-----|
| 1 | Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення | відсутнє або дуже слабка | 1 |
| 2 | Рослина: форма куща (габітус) | прямий | 1 |
| 3 | Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок | відсутнє або дуже слабке | 1 |
| 4 | Кількість рослин із зігнутих прапорцевих листком | середня | 5 |
| 5 | Час початку колосіння (перший колосок видно на 50 % колосів) | ранній | 3 |
| 6 | Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві | сильний | 7 |
| 7 | Колос: восковий наліт | сильний | 7 |
| 8 | Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі | сильний | 7 |
| 9 | Рослина: за висотою (стебло і колос) | середня | 5 |
| 10 | Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом) | слабко виповнена | 3 |
| 11 | Колос: форма (вигляд збоку) | циліндрична | 2 |
| 12 | Колос: за щільністю | середній | 5 |
| 13 | Колос: за довжиною (без остюків і зубців) | середній | 5 |
| 14 | Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок | навіть остюки | 3 |
| 15 | Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною | дуже довгі | 9 |
| 16 | Колос: забарвлення | біле або солом'яно-жовте | 1 |
| 17 | Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла | слабке | 3 |
| 18 | Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса) | вузьке | 3 |
| 19 | Нижня колоскова луска. Плече: за формою | пряме | 3 |
| 20 | Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною | короткий | 3 |
| 21 | Нижня колоскова луска. Зубець: за формою | ледь зігнутий | 3 |
| 22 | Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні | слабке | 3 |
| 23 | Нижня квітова луска. Зубець: за формою | ознака не визначалась | 0 |
| 24 | Зернівка: забарвлення | червоне | 2 |
| 25 | Зернівка: забарвлення у фенолі | помірне | 5 |
| 26 | Тип розвитку | озимий | 1 |
| 27 | Зернівка: за довжиною | середня | 5 |
| 28 | Зернівка: за шириною | середня | 5 |
| 29 | Зернівка: відношення довжина / ширина | велике | 7 |
| 30 | Зернівка: за крупністю | середня | 5 |
| 31 | Язичок: виявлення | короткий | 3 |
| 32 | Нижня квітова луска: кіль | відсутній | 1 |
| 33 | Вушка: за формою | гострі | 2 |
| 34 | Колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні | слабке | 3 |
| 35 | Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса) | ланцетна | 4 |

Результат польових досліджень показників господарської придатності

| Показник | Значення | | |
|---|----------|---------|------|
| | С | Л | П |
| Урожайність, ц/га | 51,6 | 60,6 | 53,2 |
| + - до середньої урожайності сортів за 5 попередніх років, ц/га | 4,2 | -1,9 | -2,3 |
| % | 9 | -3 | -4 |
| Вегетаційний період, днів | 263 | 272 | 279 |
| Висота рослин, см | 86 | 88 | 87 |
| Маса 1000 зерен, г | 40,3 | 42,3 | 45,2 |
| Зимостійкість: польова оцінка, бал | 8,4 | 8,6 | 8,8 |
| Стійкість до, бал: полягання | 7,4 | 7,8 | 8,5 |
| осипання | 8,8 | 8,5 | 8,7 |
| посухи | 8,3 | 8,4 | 8,8 |
| борошнистої роси | 8,1 | 8,6 | 8,4 |
| бурої іржі | 8,4 | 8,4 | 8,3 |
| фузаріозу | 9,0 | 8,7 | 8,8 |
| Вміст білка, % | 13,7 | 13,4 | 13,4 |
| Вміст клейковини, % | 28,4 | 28,0 | 28,2 |
| W _{o.a.} | 266 | 270 | 267 |
| Об'єм хліба, мл | 1040 | 980 | 1000 |
| Напрямок використання | ц | ц | ц |
| Морозо-, зимостійкість (за даними ІР): | | | |
| загальна оцінка, бал | | 5,0 | |
| група зимостійкості | | середня | |

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.