

Вид: Тритикале (озиме) *Triticosecale* Witt.

Заявка № 17022001 Назва сорту: Пріоритет **Заявник (код):** 355 **Власник сорту (код):** 355

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.02.2021 **Патент №** 210531

Дата пріоритету: 10.03.2017

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 03.03.2021

Свідоцтво про державну реєстрацію № 210501

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| № | Ознака | Проявлення | Код | Примітка |
|----|--|--------------------------|-----|----------|
| 1 | Рослина: плоїдність | гексаплоїд | 6 | |
| 2 | Колеоптіль: антоціанове забарвлення | помірне | 5 | |
| 3 | Рослина: габітус | напівпрямий | 3 | |
| 4 | Рослина: кількість рослин з похилими прапорцевими листками | мала | 3 | |
| 5 | Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок | відсутнє або дуже слабке | 1 | |
| 6 | Початок колосіння (перший колосок помітний у 50% рослин) | середнє | 5 | |
| 7 | Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві | помірний | 5 | |
| 8 | Остюки: антоціанове забарвлення | слабке | 3 | |
| 9 | Пиляки: антоціанове забарвлення | відсутнє або дуже слабке | 1 | |
| 10 | Прапорцевий листок: листкова пластинка за довжиною | довга | 7 | |
| 11 | Прапорцевий листок: листкова пластинка за шириною | вузька | 3 | |
| 12 | Колос: сизий наліт | помірний | 5 | |
| 13 | Стебло: інтенсивність опушення верхнього (підколосового) міжвузля | помірне | 5 | |
| 14 | Рослина: за висотою (разом зі стеблом, колосом та остюками) | середня | 5 | |
| 15 | Колос: розміщення остюків | за всією довжиною | 3 | |
| 16 | Остюки: за довжиною відносно колосу | короткі | 3 | |
| 17 | Нижня колоскова луска: кільовий зубець за довжиною (колосок із середньої третини колоса) | короткий | 3 | |
| 18 | Нижня колоскова луска: розмір другого зубця (як для 17) | відсутній або дуже малий | 1 | |
| 19 | Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні (як для 17) | відсутнє | 1 | |
| 20 | Соломина: за виповненням (поперечний переріз між основою колоса і верхнім вузлом) | порожниста | 3 | |
| 21 | Колос: забарвлення | сіро-димчасте | 2 | |
| 22 | Колос: за щільністю | помірно щільний | 5 | |
| 23 | Колос: за довжиною (без остюків) | середній | 5 | |
| 24 | Колос: за шириною (вигляд збоку) | середній | 5 | |
| 25 | Зернівка: забарвлення у фенолі | відсутнє або дуже світле | 1 | |
| 26 | Тип розвитку | озимий | 1 | |
| 27 | Колос: за формою | циліндричний | 2 | |
| 28 | Колос: остюки | наявні | 9 | |
| 29 | Вісь колосу: за міцністю | гнучка | 9 | |
| 30 | Колосок: кількість квіток | середня | 5 | |
| 31 | Колосок: плідність квіток | плідні | 1 | |
| 32 | Зернівка: за формою | видовжена | 5 | |
| 33 | Зернівка: забарвлення | коричневе | 5 | |
| 34 | Зернівка: за характером поверхні | слабко зморшкувата | 7 | |
| 35 | Зернівка: за крупністю | крупна | 7 | |
| 36 | Колос: положення в просторі | напівпоникле | 7 | |

Результат польових досліджень показників господарської придатності

| Показник | Значення | | |
|---|----------|------|-------|
| | С | Л | П |
| Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га | | 5,58 | 4,62 |
| Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га | | 6,01 | 6,17 |
| +, - до усередненої урожайності, т/га | | 0,43 | 1,55 |
| +, - до усередненої урожайності, % | | 7,8 | 33,5 |
| Довірчий інтервал, т/га | | 0,21 | 0,17 |
| Тривалість періоду вегетації, дів | | 280 | 277 |
| Висота рослини, см | | 94,6 | 113,8 |
| Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г | | 53,3 | 45,6 |
| Череззерниця, % | | 5,3 | 9,4 |
| Вміст білка, % | | 12,8 | 12,5 |
| Вміст морозобійних зерен, % | | 0 | 0 |
| Стійкість до вилягання, бал | | 8 | 8 |
| Стійкість до обсіпання, бал | | 9 | 8 |
| Стійкість до посухи, бал | | 9 | 8 |
| Зимостійкість: польова оцінка, бал | | 8 | 8 |
| Стійкість проти борошнистої роси, бал | | 9 | 8 |
| Стійкість проти бурої іржі, бал | | 9 | 8 |
| Стійкість проти корневих гнилей, бал | | 9 | 8 |
| Стійкість проти фузаріозу колоса, бал | | 9 | 8 |
| Напрямок використання | | зерн | зерн |

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.