

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill

Заявка № 18045037 Назва сорту: ЕС БАШЕЛОР **Заявник (код):** 806 **Власник сорту (код):** 806

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021

Свідоцтво про державну реєстрацію № 210188

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	дуже слабка	1	
3	Рослина: тип росту	напівдетермінантний	2	
4	Рослина: габітус (характер росту)	напівпрямий	3	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	слабка	3	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренойцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірна	5	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	видовжено-плеската	4	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насінній оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	чорне	6	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	інше	2	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	від дуже раннього до раннього	2	
20	Рослина: час досягання	ранній	3	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,53	3,07	2,48
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	2,03	2,68	2,74
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,5	-0,39	0,26
+, - до усередненої урожайності, %	33	-12,6	10,4
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,16	0,16
Тривалість періоду вегетації, діб	112	112	125
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	151,8	177,4	167
Висота рослини, см	70,9	73	82,9
Висота прикріплення нижнього бобу, см	8,6	9,9	11
Стійкість до вилягання, бал	8	9	7
Стійкість до обсіпання, бал	8	7	7
Стійкість до посухи, бал	6	7	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	8	7
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	9	6
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	7	6
Стійкість проти септоріозу, бал	9	7	8
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	9	8
Вміст білка, %	38,9	44,7	40,7
Вміст олії, %	21,6	18,6	20,1
Блок (Група стиглості)	7	7	7
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, сл	сбіл, сл	сбіл, сл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СП.