

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill

Заявка № 18045034 Назва сорту: ЕС ЛУКСОР Заявник (код): 806 Власник сорту (код): 806

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021

Свідоцтво про державну реєстрацію № 210187

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Рослина: тип росту	від напівдетермінантного до індетермінантного напівпрямий	3	
4	Рослина: габітус (характер росту)	рудувато-коричневе	2	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	середня	5	
6	Рослина: за висотою	помірна	5	
7	Листок: пухирчастість	загостренояйцеподібна	3	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	великий	7	
9	Листок: розмір бічного листочка	сильна	7	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	фіолетове	2	
11	Квітка: забарвлення	помірна	5	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	середній	5	
13	Насінина: розмір	кулясто-плеската	2	
14	Насінина: форма	жовте	1	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	ознака не визначена	0	
16	Насінина: забарвлення в насінній оболонці, викликане реакцією пероксидази	темно-коричневе	4	
17	Насінина: забарвлення рубчика	як у насінній оболонці	1	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	від дуже раннього до раннього	2	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	від дуже раннього до раннього	2	
20	Рослина: час достигання	від дуже раннього до раннього	2	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,53	3,07	
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	2,19	2,68	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,66	-0,39	
+, - до усередненої урожайності, %	43,3	-12,8	
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,16	
Тривалість періоду вегетації, діб	127	111	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	162,9	194,2	
Висота рослини, см	67,9	68,6	
Висота прикріплення нижнього бобу, см	8,4	9,6	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість до обсипання, бал	7	7	
Стійкість до посухи, бал	6	8	
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	9	
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	9	
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	7	
Стійкість проти септоріозу, бал	9	8	
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	9	
Вміст білка, %	36,9	40,9	
Вміст олії, %	23,5	21,4	
Блок (Група стиглості)	7	7	
Напрямок використання	зерн	зерн	
Якість	сбіл, вл	сбіл, сл	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.