

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill

Заявка № 18045032 Назва сорту: ЕС ТРІБОР Заявник (код): 806 Власник сорту (код): 806

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021

Свідоцтво про державну реєстрацію № 210186

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гілокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гілокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Рослина: тип росту	індегермінантний	4	
4	Рослина: габітус (характер росту)	напівлінговий	3	
5	Рослина: забарвлення опушенні головного стебла (в середній третині)	сіре	1	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	слабка	3	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояйцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	великий	7	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірна	5	
13	Насініна: розмір	середній	5	
14	Насініна: форма	куляста	1	
15	Насініна: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насініна: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насініна: забарвлення рубчика	світло-коричневе	3	
18	Насініна: забарвлення см'яніжки рубчика	як у насіннєвої оболонки	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	від раннього до середнього	4	
20	Рослина: час достигання	від раннього до середнього	4	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,53	3,07	
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	2,05	2,91	
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,52	-0,16	
+,- до усередненої урожайності, %	34,3	-5,2	
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,16	
Тривалість періоду вегетації, діб	130	118	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	156,2	183,7	
Висота рослини, см	67,4	71,9	
Висота прикріплення нижнього бобу, см	8,7	12,9	
Стійкість до вилягання, бал	9	8	
Стійкість до обсипання, бал	8	9	
Стійкість до посухи, бал	7	7	
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	9	
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	9	
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	9	
Стійкість проти септоріозу, бал	9	9	
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	9	
Вміст білка, %	37	41,3	
Вміст олії, %	22,8	20,6	
Блок (Група стиглості)	7	7	
Напрям використання	зерн	зерн	
Якість	сбіл, вл	сбіл, сл	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.