

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill

Заявка № 18045036 Назва сорту: ЕС ШАНЦЕЛЛОР Заявник (код): 806 Власник сорту (код): 806

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021

Свідоцтво про державну реєстрацію № 210189

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Рослина: тип росту	напівдетермінантний	2	
4	Рослина: габітус (характер росту)	від прямого до напівпрямого	2	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричнєве	2	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	помірна	5	
8	Листок: форма бічного листочка (триїчастого листка)	загостренояйцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	сильна	7	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	округло-видовжена	5	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	темно-коричнєве	4	
18	Насінина: забарвлення сім'яної рубчика	як у насіннєвій оболонці	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	ранній	3	
20	Рослина: час досягання	ранній	3	

### Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,53	3,07	2,48
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	2,19	2,88	3,12
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,66	-0,19	0,64
+, - до усередненої урожайності, %	43,3	-6,2	25,9
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,16	0,16
Тривалість періоду вегетації, діб	114	110	122
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	153,1	181,7	173,9
Висота рослини, см	71,7	82	84,9
Висота прикріплення нижнього бобу, см	8,5	12,8	11,5
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість до обсіпання, бал	9	8	8
Стійкість до посухи, бал	6	8	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	8	7
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	9	8
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	8	7
Стійкість проти септоріозу, бал	9	9	7
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	9	9
Вміст білка, %	36,5	39,9	36,2
Вміст олії, %	23,6	21,3	23,1
Блок (Група стиглості)	7	7	7
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, вл	сбіл, сл	сбіл, вл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СП.