

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill

Заявка № 18045042 Назва сорту: Лія Заявник (код): 1807 Власник сорту (код): 1807

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 11.02.2021 Патент № 210436

Дата пріоритету: 03.12.2018

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021

Свідоцтво про державну реєстрацію № 210185

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Рослина: тип росту	від напівдетермінантного до індетермінантного	3	
4	Рослина: габітус (характер росту)	напівпрямий	3	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	помірна	5	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренойцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірна	5	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	видовжено-плеската	4	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насінній оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	темно-коричневе	4	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	інше	2	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	від дуже раннього до раннього	2	
20	Рослина: час достигання	від дуже раннього до раннього	2	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,59	3	2,75
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	1,54	2,26	2,75
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,05	-0,74	0
+, - до усередненої урожайності, %	-3,4	-24,6	0
Довірчий інтервал, т/га	0,14	0,17	0,18
Тривалість періоду вегетації, діб	103	103	112
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	151	166,8	157,7
Висота рослини, см	68,1	78,6	82,4
Висота прикріплення нижнього бобу, см	9	9,5	10,9
Стійкість до вилягання, бал	8	8	6
Стійкість до обсипання, бал	5	7	7
Стійкість до посухи, бал	6	6	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	9	5
Стійкість проти аскохітозу, бал	8	9	8
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	7	5
Стійкість проти септоріозу, бал	8	7	8
Стійкість проти фузаріозу, бал	8	9	9
Вміст білка, %	37	40,8	38,1
Вміст олії, %	23,3	21	22,2
Блок (Група стиглості)	6	6	6
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, вл	сбіл, сл	сбіл, вл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СП.