

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill

Заявка № 19045001 Назва сорту: ОАЦ Аклайм **Заявник (код):** 2557 **Власник сорту (код):** 2557

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.02.2021 **Патент № 210529**

Дата пріоритету: 18.02.2019

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.01.2021

Свідоцтво про державну реєстрацію № 210394

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Рослина: тип росту	від напівдетермінантного до індетермінантного	3	
4	Рослина: габітус (характер росту)	напівпрямий	3	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	від низької до середньої	4	
7	Листок: пухирчастість	помірна	5	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояйцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірна	5	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	округло-видовжена	5	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	жовте	2	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	як у насіннєвій оболонці	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	ранній	3	
20	Рослина: час досягання	від раннього до середнього	4	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,53	3,07	2,48
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	2,27	2,93	3,14
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,74	-0,14	0,66
+, - до усередненої урожайності, %	48,1	-4,7	26,7
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,16	0,16
Тривалість періоду вегетації, діб	116	114	126
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	157,8	192,2	185,8
Висота рослини, см	67,3	72,7	81,5
Висота прикріплення нижнього бобу, см	9,9	11,6	10,4
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість до обсіпання, бал	7	9	8
Стійкість до посухи, бал	6	5	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	9	6
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	9	9
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	7	6
Стійкість проти септоріозу, бал	9	8	8
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	9	9
Вміст білка, %	35,4	40,1	37,2
Вміст олії, %	23,7	21,3	22,2
Блок (Група стиглості)	7	7	7
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, вл	сбіл, сл	сбіл, вл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.