

**Вид:** Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill

**Заявка № 17045045 Назва сорту:** Таверна **Заявник (код):** 1591 **Власник сорту (код):** 1591

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 28.01.2021 **Патент № 210392**

**Дата пріоритету:** 27.11.2017

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 21.01.2021

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 210392**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
3	Рослина: тип росту	детермінантний	1	
4	Рослина: габітус (характер росту)	напівпрямий	3	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	сіре	1	
6	Рослина: за висотою	від низької до середньої	4	
7	Листок: пухирчастість	помірна	5	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренойцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	великий	7	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	слабка	3	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	видовжено-плеската	4	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насінневі оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	темно-коричневе	4	
18	Насінина: забарвлення сім'яніжки рубчика	як у насінневої оболонки	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	ранній	3	
20	Рослина: час досягання	ранній	3	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,68	2,29	1,88
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	1,68	2,71	2,37
+, - до усередненої урожайності, т/га	0	0,42	0,49
+, - до усередненої урожайності, %	0	18,4	26
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,12	0,08
Тривалість періоду вегетації, діб	107	99	111
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	148	178,3	175,3
Висота рослини, см	57,5	60,2	82,3
Висота прикріплення нижнього бобу, см	8,8	10,6	12,2
Стійкість до вилягання, бал	9	7	7
Стійкість до обсіпання, бал	8	8	8
Стійкість до посухи, бал	8	7	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	8	8
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	8	9
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	8	8
Стійкість проти септоріозу, бал	8	9	8
Стійкість проти фузаріозу, бал	8	9	9
Вміст білка, %	35,8	39,4	35,8
Вміст олії, %	22,7	20,2	20,9
Блок (група стиглості)	6	6	6
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, вл	сбіл, сл	сбіл, сл

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.