

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill

Заявка № 18045047 Назва сорту: Фантазія Заявник (код): 1581 Власник сорту (код): 1581

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.02.2021 Патент № 210528

Дата пріоритету: 27.12.2018

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 16.02.2021

Свідоцтво про державну реєстрацію № 210480

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Рослина: тип росту	від напівдетермінантного до індетермінантного	3	
4	Рослина: габітус (характер росту)	напівпрямий	3	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	слабка	3	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	слабка	3	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	округло-видовжена	5	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насінній оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	темно-коричневе	4	
18	Насінина: забарвлення сім'яної рубчика	інше	2	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	від дуже раннього до раннього	2	
20	Рослина: час достигання	від дуже раннього до раннього	2	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,59	3	2,75
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	1,87	2,37	2,41
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,28	-0,63	-0,34
+, - до усередненої урожайності, %	17,6	-20,9	-12,4
Довірчий інтервал, т/га	0,14	0,17	0,18
Тривалість періоду вегетації, діб	105	106	119
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	141,9	154,3	164,5
Висота рослини, см	66	68,5	73,8
Висота прикріплення нижнього бобу, см	10,3	14,2	14,6
Стійкість до вилягання, бал	7	4	5
Стійкість до обсипання, бал	7	7	7
Стійкість до посухи, бал	6	6	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	9	5
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	8	9
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	7	5
Стійкість проти септоріозу, бал	9	8	7
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	9	9
Вміст білка, %	36,6	40,6	38,2
Вміст олії, %	22	19,9	20,8
Блок (Група стиглості)	6	6	6
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, сл	сбіл, сл	сбіл, сл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.