

Вид: Рис посівний *Oryza sativa* L.

Заявка № 18017001 Назва сорту: Меридіан 32 **Заявник (код):** 1715 **Власник сорту (код):** 1715
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 26.02.2021 **Патент № 210569**

Дата пріоритету: 20.12.2018

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021

Свідоцтво про державну реєстрацію № 210122

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Основний листок: забарвлення піхви	зелене	1	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
4	Листок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
5	Листок: поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
6	Листкова піхва: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
7	Листкова піхва: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
8	Листок: опушення поверхні пластинки	слабке	3	
9	Листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє	1	
10	Листок: антоціанове забарвлення шийки	відсутнє	1	
11	Листок: форма язичка	гостра	2	
12	Листок: забарвлення язичка	безбарвний	1	
13	Листкова пластинка: за довжиною	коротка	3	
14	Листкова пластинка: за ширину	середня	5	
15	Прапорцевий листок: положення пластинки (раннє обстеження)	напівпрямe	3	
16	Прапорцевий листок: положення пластинки (пізнє обстеження)	напівпрямий	3	
17	Рослина: габітус	ознака не визначається	0	
18	Тілки для сланких сортів. Стебло: здатність утворювати коліно	середній	5	
19	Час появи волоті (50% рослин з волотями)	відсутні	1	
20	Чоловіча стерильність	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Нижня квіткова луска: антоціанове забарвлення кіля (раннє обстеження)	відсутнє або дуже слабке	1	
22	Нижня квіткова луска: антоціанове забарвлення зони під верхівкою (раннє обстеження)	відсутнє або дуже слабке	1	
23	Нижня квіткова луска: антоціанове забарвлення верхівки (раннє обстеження)	відсутнє або дуже слабке	1	
24	Колосок: забарвлення приймочки	біле	1	
25	Стебло: за товщиною	середнє	5	
26	Лише несланкі сорти. Стебло: за довжиною (включно волоть)	довге	7	
27	Стебло: антоціанове забарвлення вузлів	відсутнє	1	
28	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення вузлів	ознака не визначається	0	
29	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє	1	
30	Волоть: головна вісь за довжиною	середня	5	
31	Волоть: кількість на рослині	середня	5	
32	Волоть: остишки	наявні	9	
33	Волоть: забарвлення остишків (раннє обстеження)	світло-золотисте	1	
34	Волоть: розташування остишків	лише на верхній половині	3	
35	Волоть: найдовші остишки за довжиною	дуже короткі	1	
36	Колосок: опущення нижньої квіткової луски	слабке	3	
37	Колосок: забарвлення верхівки нижньої квіткової луски	живутувате	2	
38	Волоть: забарвлення остишків (пізнє обстеження)	світло-золотисте	1	
39	Волоть: положення відносно стебла	пряме	1	
40	Волоть: вторинне гілкування	відсутнє	1	
41	Волоть: тип вторинного гілкування	ознака не визначається	0	
42	Волоть: положення гілок	пряме	1	
43	Волоть: повнота виявлення (розгортання)	сильна	7	
44	Час досягнання	середній	5	
45	Листок: час старіння (пожовтіння)	середній	5	
46	Нижня квіткова луска: забарвлення	світло-золотисте	1	
47	Нижня колоскова луска: орнаментація	відсутня	1	
48	Нижня колоскова луска: антоціанове забарвлення кіля (пізнє обстеження)	відсутнє або дуже слабке	1	
49	Нижня квіткова луска: антоціанове забарвлення зони під верхівкою (пізнє обстеження)	відсутнє або дуже слабке	1	
50	Нижня квіткова луска: антоціанове забарвлення верхівки (пізнє обстеження)	відсутнє або дуже слабке	1	
51	Колоскова луска: за довжиною	коротка	3	
52	Колоскова луска: забарвлення	солом'яне	1	
53	Зернівки: маса 1000 шт.	середня	5	
54	Зернівка: за довжиною	коротка	3	
55	Зернівка: за ширину	середня	5	
56	Нижня квіткова луска: реакція на фенол	ознака не визначалася	0	
57	Нижня квіткова луска: інтенсивність фенольної реакції (забарвлення)	ознака не визначалася	0	
58	Обрушена зернівка: за довжиною	коротка	3	
59	Обрушена зернівка: за ширину	середня	5	
60	Обрушена зернівка: форма (вигляд збоку)	напівверетеноподібна	3	
61	Обрушена зернівка: забарвлення	біле	1	
62	Ендосперм: тип	ознака не визначалася	0	
63	Ендосперм: за вмістом амілози	ознака не визначалася	0	
64	Лужна дигестія	ознака не визначалася	0	
65	Обрушена зернівка: аромат	відсутній або дуже слабкий	1	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га – 10,12. Маса 1000 зерен, г – 28,0. Вегетаційний період, діб – 122. Плівковість, % – 17,1. Склоподібність, % – 100. Вихід цілого ядра, % – 92,7. Група стиглості – 5. Стійкість проти збудників хвороб, балів (1–9): пірикуляріоз – 8, фузаріоз – 9, аскохітоз – 9, гельмінтоспоріоз – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.