

**Вид:** Люцерна посівна *Medicago sativa* L.

**Заявка № 17196002 Назва сорту:** Просементі Бологна **Заявник (код):** 2285 **Власник сорту (код):** 2285

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 18.01.2021

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 210248**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус восени першого року (2 тижні до рівнодення)	напівпрямий	3	
2	Рослина: за природною висотою через 2 тижні після осіннього рівнодення після сівби (скошування за 2 тижні до рівнодення)	середня	5	
3	Рослина: за природною висотою через 6 тижнів після осіннього рівнодення (скошування за 2 тижні після рівнодення)	середня	5	
4	Рослина: за природною висотою навесні (один місяць після початку відростання другого року після сівби)	довга	7	
5	Час початку цвітіння	пізній	7	
6	Квітка: частота рослин з дуже темно-синьо-фіолетовими квітками	середня	5	
7	Квітка: частота рослин із змішаними квітками	відсутня або дуже низька	1	
8	Квітка: частота рослин з кремовими, білими або жовтими квітками	відсутня або дуже низька	1	
9	Рослина: за довжиною найдовшого стебла за повного цвітіння (включаючи повністю сформоване суцвіття)	довга	7	
10	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 1-го скошування	висока	7	
11	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 2-го скошування	висока	7	
12	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 3-го скошування	висока	7	
13	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 4-го скошування	висока	7	
14	Рослина: за природною висотою через 2 тижні після наступного дня осіннього рівнодення у рік сівби (скошування за 2 тижні до рівнодення)	висока	7	
15	Рослина: за природною висотою через 6 тижнів після наступного дня осіннього рівнодення у рік сівби (скошування за 2 тижні після рівнодення)	висока	7	
16	Рослина: тенденція до зростання під час зими	стан спокою клас 6	6	
17	Стійкість проти <i>Verticillium albo-atrum</i>	наявна	9	
18	Стійкість проти <i>Ditylenchus dipsaci</i>	наявна	9	
19	Стійкість проти <i>Colletotrichum trifolii</i>	наявна	9	
20	Стійкість проти <i>Phytophthora medicaginis</i>	наявна	9	
21	Стійкість проти <i>Acyrthosiphon kondoi</i>	наявна	9	
22	Стійкість проти <i>Theroaphis maculata</i>	наявна	9	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сухої речовини сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,53	8,97	10,09
Урожайність сухої речовини, т/га	5,36	8,87	8,31
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,83	-0,1	-1,78
+,- до усередненої урожайності, %	18,3	-1,2	-17,6
Довірчий інтервал, т/га	6,3	15,7	14,4
Тривалість періоду вегетації, діб	69	133	93
Залишаність, %	37,6	58,4	42,8
Вміст білка (сирого протеїну), %	16,7	18,7	20,3
Стійкість до вилягання, бал	8	7	8
Стійкість до посухи, бал	8	7	8
Стійкість проти іржі, бал	8	8	9
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	8	9
Стійкість проти бурої плямистості, бал	9	9	8
Зимостійкість, бал	9	7	7
Урожайність насіння (середнє за 4 повторення), т/га	0,9	1,7	1,8
Блок	1	1	1
Напрям використання	корм	корм	корм

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.**