

Вид: Капуста цвітна *Brassica oleracea* L. convar. *botrytis* (L.) Alef. var. *botrytis* L.**Заявка № 19101003 Назва сорту:** ДЖАВА **Заявник (код):** 1050 **Власник сорту (код):** 1050**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 14.01.2021**Свідоцтво про державну реєстрацію № 210027****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гілокотиля	наявне	9	
2	Рослина: за висотою (за збирання)	середня	5	
3	Стебло: за довжиною (до місця прикріплення першого листка)	середнє	5	
4	Листок: положення	напівпрямe	3	
5	Листок: за довжиною	середній	5	
6	Листок: за шириною	середній	5	
7	Листок: відношення ширина/довжина	середнє	5	
8	Листок: часточковість	відсутня	1	
9	Листок: забарвлення (з восковим нальотом, якщо є)	стро-зелене	2	
10	Листок: інтенсивність забарвлення (як для 9)	помірна	5	
11	Листок: закручування верхівки	слабке	3	
12	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	2	
13	Листок: пухирчастість	слабка	3	
14	Листок: гофрованість біля головної жилки	помірна	5	
15	Листок: хвильчастість краю	помірна	5	
16	Головка: покриття внутрішніми листками	частково покрита	2	
17	Головка: за висотою	низька	3	
18	Головка: діаметр	середній	5	
19	Головка: форма поздовжнього розрізу	поперечно вузько-еліптична	4	
20	За винятком сортів з трикутною головкою. Головка: закручування краю	сильне	7	
21	Головка: забарвлення	блувате	1	
22	Головка: горбкуватість	помірна	5	
23	Головка: текстура	помірна	5	
24	Головка: антоціанове забарвлення після збиральної стигlosti	наявне	9	
25	Квітка: забарвлення	біле	1	
26	Скоростиглість: за весняного садіння	пізня	7	
27	Скоростиглість: за літнього садіння	середній осінній тип	5	
28	Чоловіча стерильність	повна	3	

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 35. Товарна врожайність, т/га – 25. Період від повних сходів до початку достигання, діб – 85. Період плодоношення, діб – 10. Вміст білка, % – 2,3, вітаміну С, мг % – 45, загального цукру, % – 2,2, сухої речовини, % – 8,4. Стійкість до хвороб, балів (1–9): бактеріоз слизовий – 6, бактеріоз судинний – 6.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.