

Вид: Капуста цвітна *Brassica oleracea* L. convar. *botrytis* (L.) Alef. var. *botrytis* L.

Заявка № 19101010 Назва сорту: Марді **Заявник (код):** 840 **Власник сорту (код):** 840

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021

Свідоцтво про державну реєстрацію № 210197

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилля	наявне	9	
2	Рослина: за висотою (за збирання)	середня	5	
3	Стебло: за довжиною (до місця прикріплення першого листка)	коротке	3	
4	Листок: положення	напівпряме	3	
5	Листок: за довжиною	середній	5	
6	Листок: за шириною	середній	5	
7	Листок: відношення ширина/довжина	середнє	5	
8	Листок: часточковість	відсутня	1	
9	Листок: забарвлення (з восковим нальотом, якщо є)	сіро-зелене	2	
10	Листок: інтенсивність забарвлення (як для 9)	помірна	5	
11	Листок: закручування верхівки	слабке	3	
12	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	2	
13	Листок: пухирчатість	слабка	3	
14	Листок: гофрованість біля головної жилки	слабка	3	
15	Листок: хвилястість краю	слабка	3	
16	Головка: покриття внутрішніми листками	частково покрита	2	
17	Головка: за висотою	середня	5	
18	Головка: діаметр	середній	5	
19	Головка: форма поздовжнього розрізу	поперечно помірно-еліптична	3	
20	За винятком сортів з трикутною головою. Головка: закручування краю	помірне	5	
21	Головка: забарвлення	білувате	1	
22	Головка: горбкуватість	помірна	5	
23	Головка: текстура	помірна	5	
24	Головка: антоціанове забарвлення після збиральної стиглості	наявне	9	
25	Квітка: забарвлення	жовте	2	
26	Скоростиглість: за весняного садіння	середня	5	
27	Скоростиглість: за літнього садіння	ознака не визначалась	0	
28	Чоловіча стерильність	відсутня	1	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 70. Товарна врожайність, т/га – 65. Період від повних сходів до початку досягання, діб – 70. Період плодоношення, діб – 15. Вміст білка, % – 1,8, вітаміну С, мг % – 13, загального цукру, % – 18, сухої речовини, % – 24. Стійкість до хвороб, балів (1–9): бактеріоз слизовий – 7, бактеріоз судинний – 6.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.