

Вид: Салат посівний головчастий *Lactuca sativa* L. var. *capitata***Заявка № 19421009 Назва сорту:** Лілах **Заявник (код):** 2070 **Власник сорту (код):** 2070**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 14.01.2021**Свідоцтво про державну реєстрацію № 210126****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насінина: забарвлення	біле	1	
2	Сіянець: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
3	Сіянець: стім'ядолі за розміром (за повного розвитку)	середні	5	
4	Сіянець: форма стім'ядолей	еліптична	5	
5	Листок: положення у стадії 10-12 листків	напівпряме	3	
6	Листкова пластинка: за розсіченістю краю (як для 5)	нерозсічена	1	
7	Рослина: діаметр	середній	5	
8	Рослина: утворення головки	відкрита головка	2	
9	Тільки сорти із закритою головкою. Головка: перекриття верхньої частини листків	ознака не визначалась	0	
10	Головка: за щільністю	середня	5	
11	Головка: розмір	середній	5	
12	Лише для сортів маслянисто-головчастого типу у теплицях. Головка: закриття основи	ознака не визначається	0	
13	Головка: форма поздовжнього розрізу	широкоеліптична	2	
14	Листок: за товщиною	середній	5	
15	Листок: положення за збиральною стиглості (зовнішні листки у головчастого салату або сформовані листки для листкового і стеблового салатів)	напівпряме	3	
16	Листок: форма	поперечно-широкоеліптична	5	
17	Листок: форма верхівки	ознака не визначалась	0	
18	Листок: відтінок зеленого забарвлення зовнішніх листків	жовтуватий	2	
19	Листок: інтенсивність забарвлення зовнішніх листків	помірне	5	
20	Листок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
21	Листок: інтенсивність антоціанового забарвлення	дуже слабка	1	
22	Листок: поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
23	Листок: тип поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
24	Листок: глянсуватість верхнього боку	помірна	5	
25	Листок: пухирчастість	слабка	3	
26	Листок: розмір пухирів	середній	5	
27	Листкова пластинка: хвилястість краю	помірна	5	
28	Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки	наявні	9	
29	Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки за глибиною	мілка	3	
30	Листкова пластинка: ступінь розсіченості краю верхівки	помірна	5	
31	Тільки сорти з мілкою розсіченістю краю верхівки. Листкова пластинка: тип розсіченості	ознака не визначається	0	
32	Листкова пластинка: жилкування	невіялоподібне	1	
33	Пазушне гілкування	слабке	3	
34	Час збиральної стигlosti	ранній	3	
35	Час початку з'явлення квітконосів у умовах довгого дня	середній	5	
36	Рослина: за висотою (квітуюча рослина)	середня	5	
37	Рослина: фасціація (під час цвітіння)	відсутня	1	
38	Стебло: інтенсивність фасціації (під час цвітіння)	ознака не визначається	0	
39	Стійкість проти борошнистої роси (<i>Bremia lactucae</i>) Isolate B1:16	наявна	9	
40	Стійкість проти вірусу мозаїки салату (LMV) Патотип Ls 1	наявна	9	
41	Стійкість проти попелиць (види <i>Aphis gossypii</i> , <i>A. fabae</i> , <i>Myzodes persicae</i>)	наявна	9	
42	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lactucae</i>	стійкий (наявна)	9	

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Товарна врожайність, т/га – 105. Середня маса головки, г – 750. Щільність головки, бал (1–9) – 8. Тривалість періоду від повних сходів до технічної стиглості, діб – 65. Група стиглості: 5 – середня. Вміст у головках: сухої речовини, % – 10, цукрів, % – 16, вітаміну С, мг% – 2,8. Холодостійкість, бал (1–9) – 8. Посухостійкість, бал (1–9) – 8. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): несправжньої борошнистої роси (*Bremia lactucae* Regel f. *sonchi* (Schw.) Dzhanuz) – 9, чорної гнилі (*Rhizoctonia solani* Kuhn) – 8, септоріозу (*Septoria lactucae* Pass.) – 9, вірусу мозаїки (*Lactuca virus*) – 8. Стійкість до пошкодження (заселення) шкідниками, бал (1–9): попелиця – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП, Згр.