

Вид: Виноград справжній *Vitis vinifera* L.

Заявка № 19304007 Назва сорту: Кобера 5ББ 211161 **Заявник (код):** 1904 **Власник сорту (код):** 1904

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент № 210152**

Дата пріоритету: 09.01.2019

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021

Свідоцтво про державну реєстрацію № 210193

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Час розпускання бруньок	пізній	7	
2	Молодий пагін: відкритість верхівки	напіввідкрита	3	
3	Молодий пагін: щільність прилеглих волосків на верхівці	щільна	7	
4	Молодий пагін: антоціанове забарвлення прилеглих волосків на верхівці	помірне	5	
5	Молодий пагін: щільність прямих волосків на верхівці	відсутні або дуже нещільна	1	
6	Молодий листок: забарвлення верхнього боку пластинки	зелене з антоціановими плямами	3	
7	Молодий листок: щільність прилеглих волосків між жилками на нижньому боці пластинки	відсутні або дуже нещільна	1	
8	Молодий листок: щільність прямих волосків на жилках із нижнього боку пластинки	середня	5	
9	Пагін: положення (до підв'язування)	горизонтальне	5	
10	Пагін: забарвлення дорсального боку міжвузлів	червоне	3	
11	Пагін: забарвлення вентрального боку міжвузлів	червоне	3	
12	Пагін: забарвлення дорсального боку вузлів	червоне	3	
13	Пагін: забарвлення вентрального боку вузлів	червоне	3	
14	Пагін: щільність прямих волосків на міжвузлях	нещільна	3	
15	Пагін: вусики за довжиною	дуже довгі	9	
16	Квітка: статеві органи	відхилені тичинки і добре розвинена маточка	4	
17	Розвинений листок: розмір пластинки	великий	7	
18	Розвинений листок: форма пластинки	округла	4	
19	Розвинений листок: пухирчастість верхнього боку пластинки	слабка	3	
20	Розвинений листок: кількість лопатей	три	2	
21	Розвинений листок: верхні бічні вирізи за глибиною	мілкі	3	
22	Лише сорти з лопатевими листками. Розвинений листок: розташування лопатей верхніх листових вирізів	відкрите	1	
23	Розвинений листок: розташування лопатей біля черешка	широко відкрите	2	
24	Розвинений листок: зубці за довжиною	середні	5	
25	Розвинений листок: відношення довжина / ширина зубця	мале	3	
26	Розвинений листок: форма зубців	обидва боки випуклі	3	
27	Розвинений листок: частка головних жилок на верхньому боці листка з антоціановим забарвленням	низька	3	
28	Розвинений листок: щільність прилеглих волосків між головними жилками з нижнього боку пластинки	нещільна	3	
29	Розвинений листок: щільність прямих волосків на головних жилках з нижнього боку пластинки	нещільна	3	
30	Розвинений листок: довжина черешка порівняно із довжиною головної жилки	коротша	2	
31	Час початку досягання ягід	пізній	7	
32	Гроно: розмір (без ніжки)	дуже малий	1	
33	Гроно: за щільністю	дуже нещільне	1	
34	Гроно: ніжка первинного гроно за довжиною	середня	5	
35	Ягода: розмір	дуже малий	1	
36	Ягода: форма	куляста	2	
37	Ягода: забарвлення шкірки (без воскового нальоту)	блакитно-чорне	9	
38	Ягода: відокремлювання від плодоніжки	важке	1	
39	Ягода: шкірка за товщиною	товста	3	
40	Ягода: антоціанове забарвлення м'якоті	відсутнє або дуже слабке	1	
41	Ягода: твердість м'якоті	м'яка або слабко тверда	1	
42	Ягода: особливий аромат	відсутній	1	
43	Ягода: утворення насіння	повноцінне	3	
44	Здерев'янілий пагін: основне забарвлення	темно-коричнєве	3	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): мілдью – 7, оїдіум – 7. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): філоксера – 7. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 7. Рівень підмерзання бруньок, бал (1–9) – 1. Рівень підмерзання лози, бал (1–9) – 1. Напрямок використання – підщ. Схема садіння – 3 × 2 м. Вихід чубуків з 1 га, тис. шт. – 100,0. Вихід чубуків з одного куща, шт. – 60,0. Тривалість вегетаційного періоду, діб – 186. Сорт одержано в результаті виділення куща – родоначальника клону.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.