

Кущ прямостоячий. Стебло округле, слабоопушене, середньої грубості, коричнево-фіолетово-зелене, 8-9 міжвузля, 90-110 см висотою. Куцистість середня, залишність 50-60%. Листки – зелені з леді помітним малоноком, м'які, малоопушенні, 3,5 x 2,2 см величини. Суцвіття – головка 2 x 1,5 см величини, щільна, рожево-червоного кольору. Плід – біб, переважно однонасінний, коричневий. Насіння жовто-фіолетового кольору, 3% твердого, середньої величини, видовжене. Вегетаційний період 115 днів, до першого укосу - 77 днів. Зимостійкий, посухостійкий, стійкий до весняних і осінніх заморозків, частково уражується хворобами. Середня врожайність сухої речовини - 93,5 ц/га, максимальна – 134 ц/га, насіння – 2,8 ц/га. Сорт дружно відростає рано навесні та після скошування, добре витримує потраву, дає два укоси. Вміст білка - 17,7%, клітковини – 22,16%.

Рекомендовано використовувати у зоні Полісся.

### **Конюшина гіbridна**

**Придністровська.** Оригінатор - Передкарпатський філіал Інституту землеробства і тваринництва західного регіону УААН.

Метод виведення: багаторазовий масовий відбір рослин із сорту Йигева-2 та перезапилення дикорослою гірською формою.

Ознаки сорту: Диплоїд. Форма куща прямостояча та проміжна. Початок цвітіння (коли зацвітають три головки на рослині) - середній. Стебло: висота (найвище стебло з головкою, через два –три тижні після середньої дати цвітіння) –довге; товщина в цей час – середнє; кількість міжвузля (через 1-2 тижні після середньої дати цвітіння; нижнє міжвузля не менше ніж 0,5 см) - від середнього до високого; слабка щільність опушенні. Залишність 40-45%. Листок: довжина (центральний листочок верхнього повністю сформованого листка під кінцевою квіткою, через 1-2 тижні після середньої дати цвітіння) – від середнього до довгого; ширина – від середнього до широкого; кількість рослин з білими відмітками – відсутні або дуже мало. Рожеве забарвлення суцвіття. Шкірка насіння – багатокольорова.

Сорт відрізняється від сорту Даубяй: відсутністю білих відмітин на листках, наявністю опушенні стебла у верхній частині.

Стійкий до борошнистої роси, незначно уражується іншими хворобами, зимостійкий. Стійкий до осипання та вилягання. Вміст білка 14-16%, клітковини – 22-25%. Середня урожайність сухої речовини - 59,2 ц/га, максимальна – 65,3 ц/га, насіння – 2,7 ц/га. Маса 1000 насінин 0,6-0,7 г.

Середньостиглий. Сінокісно-пасовищного напрямку використання.

Рекомендовано використовувати у зоні Полісся та Лісостепу.

### **Люцерна**

**Єва.** Оригінатор - Селекційно-генетичний інститут УААН.

Ознаки сорту: Висота рослини у весняний період від середньої до високої. Габітус напівпрямостоячий. Довжина центрального листочка середня, ширина – від середньої до широкої. Довжина найдовшого стебла разом з китицею при повному цвітінні - від середньої до довгої. Початок цвітіння - від раннього до середнього. Квітки: частота рослин з дуже темно-синіми і фіолетовими квітками - відсутня або дуже