

мала; частота рослин зі строкатими квітками - відсутня або дуже мала; з кремовими, білими або жовтими квітками відсутня або дуже мала. Вегетаційний період 146 днів, середньостиглий. Сорт посухостійкий, зимостійкий. Незначно уражується хворобами. Середня урожайність сухої речовини 113,2 ц/га, максимальна – 155,1 ц/га; насіння – 2,9 ц/га. Вміст білка 20,2%, клітковини - 35,9%. Рекомендовано використовувати у зоні Лісостепу та Полісся.

Серафима. Оригінатор – інститут землеробства південного регіону УААН.

Сорт створений шляхом гібридизації (*M.coerulea* Less x популяція II *M.sativa* L.) з наступним багаторазовими доборами на фоні пізньолітніх посівів.

Ознаки сорту: Рослина: натуральна довжина через 2 тижні після рівнодення у перший рік – від середньої до довгої; натуральна довжина у весняний період – від середньої до довгої; габітур (спостерігається у рядках) - прямостійний; натуральна висота, коли ранній сорт досягає періоду появи квіткових бруньок після першого зрізу, другого та третього – від середньої до високої. Довжина та ширина центрального листочка – від середнього до довгого. Довжина найдовшого стебла разом з китицею при повному цвітінні - від середнього до довгого. Початок цвітіння - від середнього до пізнього. Квітки: частота рослин з дуже темно-синіми і фіолетовими квітками – дуже висока; частота рослин зі строкатими квітками - відсутня або дуже мала; з кремовими, білими або жовтими квітками - відсутня або дуже мала. Стійкість до фузаріозного в'янення – середня.

Сорт характеризується високою адаптаційною і азотфіксуючою здатністю.

Вегетаційний період 124 дні, середньостиглий, сінокісного напрямку використання, може давати 4-5 укосів. Сорт посухостійкий, зимостійкий. Незначно уражується хворобами. Середня урожайність сухої речовини 104,8 ц/га, максимальна – 147,0 ц/га. Вміст білка - 20,5%, клітковини - 34,2%.

Рекомендовано використовувати у всіх зонах України.

Еспарцет

Кримський. Оригінатор - Кримська державна сільськогосподарська дослідна станція УААН.

Метод виведення: багаторазовий масовий відбір із гібридної популяції.

Ознаки сорту: Форма куща напіврозкинута. Стебло висотою 55-110 см, слабо опушене, 7-11 міжвузля. Кущистість середня. Залиштканість 46%. Листки темно-зеленого кольору, форма – ланцетна з тупою верхівкою. Суцвіття рожеве, рихле, довжиною при дозріванні 12-17 см, верхівка гостра. Боби великої та середньої величини, слабо зазубрені. Насіння квасолевидної форми, світло-коричневе, маса 1000 насінин 22,4 г.

Сорт має високу зимостійкість та посухостійкість, стійкий до ураження основних хвороб. Середня урожайність сухої речовини 88,1 ц/га, максимальна – 118,8 ц/га, насіння - 9,8 ц/га. Вміст білка 15,3%, клітковини – 22,7%. Сорт середньостиглий.

Рекомендовано використовувати у зоні Лісостепу та Степу.